



BC Centre for Disease Control
An agency of the Provincial Health Services Authority

655 West 12th Avenue
Vancouver, BC V5Z 4R4

604.707.2443
604.707.2441

www.bccdc.ca

Clinical Prevention Services –
STI Control

604.707.5600
604.707.5604

www.SmartSexResource.com

阿莫西林 AMOXICILLIN

阿莫西林是口服治疗某些性传播感染疾病（STI）的抗生素。

过敏 (Allergies)

- 如果您对青霉素类抗生素如阿莫西林、青霉素V-K或任何头孢菌素类抗生素如头孢克肟（Suprax®）、头孢氨苄（Keflex®）、头孢克洛（Ceclor®）或其他同类药物过敏，请告知医务人员。

怀孕/哺乳 (Pregnancy and Chest/Breastfeeding)

- 阿莫西林可在怀孕和哺乳期服用。请咨询医务人员。

警告 (CAUTION)

- 口服最后一剂阿莫西林和口服活伤寒疫苗（Vivotif®）之间，需间隔24小时或以上。
- **药物相互作用：**请注意，本文件不再列出个别药物的相互作用。如果您在服用任何处方药、非处方药、草药或消遣娱乐产品，请与医务人员讨论。

副作用 (Side effects)

- 您可能会出现皮疹、头痛、腹泻、恶心或呕吐。
- 如果您有以下过敏反应症状，请立即紧急求医：荨麻疹、呼吸困难，以及脸部、嘴唇、舌头和喉咙肿胀。

服用说明 (Instructions for Taking)

- 可餐后或空腹服药，直至结束治疗。遵循医务人员的剂量指示。
- 如果您漏服一剂，请在想起来后尽快服药，但如果服用下一剂的时间快要到了，则跳过漏服的一剂。不要服双倍剂量。

阿莫西林 AMOXICILLIN

贮存说明 (Storage Instructions)

- 贮存于15-30°C室温下。
- 避光、防高温、防潮。
- 药物超出标示的失效日期，切勿使用。
- 谨防儿童接触。

特殊说明 (Special Instructions)

- 在满足下列条件之前，不要进行性生活：
 - 您已完成治疗，**并且**
 - 您的性伴侣也已接受了治疗，而且自治疗开始以来已经过了1周，即使他们的检测结果为阴性亦需治疗。
- 如果您与未经治疗的伴侣发生性关系，或是在您或伴侣的治疗完成之前发生性行为，则需重新治疗。请与医务人员讨论。
- **治愈检查：**如果医务人员开出阿莫西林治疗衣原体或淋病，建议您在完成治疗后的**3-4周**再次接受检查，确保感染消失。

如果您有任何问题或需要更多信息，请访问 <http://www.smartsexresource.com> 或联系医务人员

。