



BC Centre for Disease Control
An agency of the Provincial Health Services Authority

655 West 12th Avenue
Vancouver, BC V5Z 4R4

Tel 604.707.2443
Fax 604.707.2441

www.bccdc.ca

Clinical Prevention Services –
STI Control:

604.707.5600
604.707.5604

www.SmartSexResource.com

メトロニダゾール

Metronidazole

メトロニダゾールは、細菌性膣炎（BV）またはトリコモナス症などの特定の性感染症（STI）の治療のために経口で服用する抗生物質です。

アレルギー（Allergies）

- メトロニダゾール（Flagyl®）にアレルギーがある場合は、ご自身の医療提供者に伝えてください。

妊娠および授乳（Pregnancy and Chest/Breastfeeding）

- メトロニダゾールは、ご自身の医療提供者との相談のうえ、妊娠第一期（最初の3か月）に、また妊娠第二期および三期に使われることがあります。
- メトロニダゾールは、処方量によっては授乳中に使われることがあります。メトロニダゾールを単回投与で2グラム処方された場合、服用後12～24時間の母乳は、薬剤の混入を避けるため、搾乳後に廃棄してください。

注意（CAUTION）

- 肝臓、血液、または神経系の疾患がある場合は、ご自身の医療提供者に伝えてください。
- アルコールまたはアルコールを含む薬剤（Nyquil®など）は、副作用（紅潮、頭痛、吐き気、嘔吐、けいれん、非常に速い動悸または不整脈、失神）の発生を防ぐため、服用の12時間前から服用までの間、治療中、および服用後24～48時間は服用しないでください。
- 既存の心臓疾患または不整脈がある場合は、ご自身の医療提供者に伝えてください。メトロニダゾール服用中は、以下の薬剤を使用しないでください。
 - 抗不整脈薬：ドロネダロン（Multaq®）
 - 抗精神病薬：ピモジド（Orap®）、ジブラシドン（Zeldox®）
 - アルコール依存症治療薬：ジスルフィラム（Antabuse®）
 - HIV薬：ロピナビル/リトナビル（Kaletra®）内用液、チプラナビル（Aptivus®）
 - 寄生蠕虫治療薬：メベンダゾール（Vermox®）
 - 経口腸チフスワクチン（Vivotif®）

メトロニダゾール（続き） Metronidazole (cont'd)

- **薬物相互作用**：個々の薬物の相互作用は、この文書には記載されなくなったことにご注意ください。処方薬、非処方薬、ハーブ、またはレクリエーション薬物を服用している場合は、医療提供者に相談してください。

副作用（Side Effects）

- 下痢、吐き気、腹痛、嘔吐、消化不良、口内の不快な金属味、尿の色が濃くなる、などの症状が起こるかもしれません。
- 発作、混乱、めまいのような神経疾患、または一時的な視覚障害があった場合は、ご自身の医療提供者に直ちに連絡し、運転や機械の操作は避けてください。
- アレルギーや皮膚反応があった場合は、すぐにご自身の医療提供者に相談してください。

服用上の注意（Instructions for Taking）

- メトロニダゾールは食物と一緒に服用することで胃もたれを軽減できます。
- 一回分を飲み忘れてしまった場合は、思い出した時にすぐその分を服用してください。ただし、次の服用時間がすぐ来る場合は、忘れた分は服用しないで次の服用時間を待ってください。二回分を一度に摂取しないでください。

保管上の注意 (Storage Instructions)

- 15～30°C の室温で保存してください。
- 光、熱、湿度を避けてください。
- 記載された有効期限を過ぎたものは使用しないでください。
- 子供の手の届かないところに保管してください。

特別な指示（Special Instructions）

細菌性膣炎の治療で服用している場合

- あなたが女性で女性のパートナーがいる場合、パートナー（たち）も細菌性膣炎の検査を受け、陽性の場合は治療を受けることをお勧めします。

トリコモナス症治療のためにメトロニダゾールを服用している場合

- 以下の時期まで性行為を避けてください。
 - 一回治療の場合はその一週間後、または7日間の治療が完了し、かつ

メトロニダゾール (続き) Metronidazole (cont'd)

- あなたのパートナー（たち）も治療を受け、治療開始から一週間が経過した時まで。これはパートナー（たち）の検査結果が陰性であった場合も同様です。
- 未治療のパートナーと性行為を行った場合、または、あなたご自身またはパートナー（たち）が治療完了前に性行為を行った場合、あなたには再治療が必要になります。ご自身の医療提供者にご相談ください。

ご質問または詳しい情報をご希望の場合は、www.smartsexresource.com にアクセスするか、またはご自身の医療提供者にご連絡ください。