

利福喷丁与异烟肼 RIFAPENTINE and ISONIAZID

利福喷丁与异烟肼是两种联合使用的抗生素，用于治疗潜伏性（非活动性或睡眠状态）结核感染，防止感染发展成活动性结核病。

我如何服用此药？(How should I take this?)

- 利福喷丁与异烟肼每周给药一次，共12周（共12剂）。
- 此药应在训练有素的医护人员在场的情况下口服。这称为直接观察预防治疗法（DOPT）。
- 应该吃过小点心（如茶和吐司）后服药，减轻胃部不适。

如果漏服一次、错过约诊或诊视，我该怎么办？(What should I do if I miss a dose, appointment, or visit?)

- 服用所有处方剂量对您来说很重要。漏服或跳过剂量可能会降低此疗法的效果。
- 如果您漏服一剂，请尽快与结核病医护人员联系，获得有关管理漏服剂量的指导。

服用此药有无禁忌？(Is there anything I should avoid when taking this?)

- 最好避免饮酒，以便减少肝脏问题。
- 如果要服用含铝或镁的抗酸药，请在服用异烟肼至少1小时后再服用。

在服用利福喷丁和异烟肼之前，请务必告知医生、护士或药剂师您正在服用的所有药物（包括非处方药）。在咨询医生或药剂师意见前，切勿开始服用新药物。

这种治疗可能有哪些副作用？(What are some possible side effects of this treatment?)

- 过敏反应（发烧、头痛、头晕、肌肉疼痛、流感样疾病、皮疹或皮肤反应）
- 胃部问题（恶心、呕吐、腹泻、食欲不振）
- 异常疲倦或虚弱
- 深色（可乐色或茶色）尿液
- 皮肤或眼白发黄
- 手脚灼热、刺痛或麻木
- 此药可造成眼泪、唾液、痰、汗、尿、粪便、母乳、皮肤、牙齿和舌头染上橘红色。这是无害的，但可能会给软性隐形眼镜和假牙永久染上颜色。

如果您出现上述任何情况或任何其他异常情况，请告诉结核病医护人员。

关于服用利福喷丁与异烟肼，我还需要知道什么？(What else do I need to know about taking rifapentine and isoniazid?)

- 您务必按医生开出的单子接受所有**化验**，并且每次都按预约的时间看医生或护士。
- 如果您**怀孕**、计划怀孕或希望用**母乳喂养**宝宝，请告诉医生。
- 利福喷丁可降低避孕药的功效。请改用另外的避孕方法（屏障法，例如避孕套、避孕膜）。
停用利福喷丁后，继续使用屏障法至少**28天**。将口服避孕药的无激素间期缩短至**4天**。
- 采用这种治疗手段时，医生会开吡哆醇（维生素**B6**），防止您的手或脚产生烧灼、刺痛或麻木感。

如果我有其他问题，应该给谁打电话？(Where do I call if I have any other questions?)

肺结核医护人员：_____

温哥华结核病服务诊所：604-707-2692

新西敏市结核病服务诊所：604-707-2698

BCCDC 疫苗与药房服务：604-707-2580