



BC Centre for Disease Control
An agency of the Provincial Health Services Authority

Provincial Tuberculosis Services

Main Switchboard
TB Services Fax

604 707 2692
604 707 2690

利奈唑胺 LINEZOLID

利奈唑胺是一种用于治疗结核病或其他相关感染的抗生素。

我该什么时间服用此药？(When should I take this?)

- 每天同一时间服用此药。这有助于您记得服药。

我该如何服用此药？(How should I take this?)

- 请按医嘱服药。
- 定时服用此药非常重要。
- 此药可在餐前或餐后服用。

如果漏服一剂，我该怎么办？(What should I do if I miss a dose?)

- 如果漏服一剂，请在想起后尽快服用。但是，如果快到该服第二天的剂量时，则不必补服。
- 不要服双倍剂量。

服用此药时我应该避免什么吗？(Is there anything I should avoid when taking this?)

- 避免食用酪胺含量高的食物或饮料，如陈年的、发酵的、腌制的、烟熏的或酵母产品（如陈年奶酪、德国酸菜、腌肉、风干肉或加工肉、块状浓缩汤料、酱油、鱼露、韩国泡菜、味噌汤、桶装啤酒、葡萄酒、牛油果、蚕豆、过熟的水果或储存不当或变质的食物）。

注：这不是完整的清单；如需更多饮食信息，请致电8-1-1联系HealthLink BC。

- 避免服用任何含有减充血剂（如伪麻黄碱）的感冒或流感制剂（如 Advil® Cold and Sinus、Claritin® Allergy + Sinus、NeoCitran® Ultra Strength Total Flu Night）

如果您正在服用**任何其他药物**，包括任何非处方产品和天然保健产品，请告诉医生、护士和药剂师。

可能有哪些副作用？(What are some possible side effects?)

- 腹泻
- 恶心
- 呕吐
- 头疼
- 头昏
- 味觉变化
- 手脚发热、麻刺或麻木感
- 阴道酵母菌感染、口腔白斑或舌头变色

与医生讨论您可能经历的任何副作用。

© 第2页



BC Centre for Disease Control
An agency of the Provincial Health Services Authority

Provincial Tuberculosis Services

Main Switchboard
TB Services Fax

604 707 2692
604 707 2690

警告(Caution): 如果您出现以下症状, 请立即停止服用此药并致电您的医生或护士:

- 皮疹、荨麻疹、瘙痒、肿胀、气喘、胸闷、呼吸困难
- 异常出血或瘀伤, 感觉非常疲倦或虚弱, 呼吸急促, 发烧和发冷, 或喉咙痛
- 血压极高
- 剧烈头痛
- 视力变化, 包括色觉的变化
- 异常的肌肉疼痛或痉挛、疲劳或虚弱、感觉寒冷、胃痛伴随呕吐、胃痛伴随呕吐或无呕吐、呼吸困难或心率不规则
- 意识混乱、躁动、不安、颤抖、发烧、心跳加快、脸潮红、大量出汗、头晕或平衡和协调的变化、精神/情绪状态的变化、严重胃部不适、呕吐或腹泻、肌肉抽搐、对光敏感或惊厥

如果您出现本信息表中未提及的任何异常症状, 请告诉医生。

关于服用利奈唑胺我还需要知道什么? (What else do I need to know about taking Linezolid?)

- 医生开出的所有**实验室检验**以及与医务人员的所有约诊都很重要, 应按时做检验及就诊。
- 如果您已**怀孕**、计划怀孕或您想用**母乳喂养**宝宝, 请告诉医务人员。
- 如果你有惊厥史, 请告诉医务人员。

此药物应存放在哪里? (Where should I store this medication?)

- 谨防儿童接触。
- 避光、防潮。
- 室温保存在阴凉干燥处。

如果我还有其他问题, 应该给谁打电话? (Where do I call if I have any other questions?)

您的医生、诊所或公共卫生单位: _____

温哥华结核病服务诊所: 604-707-2692

新西敏市结核病服务诊所: 604-707-2698

BCCDC疫苗与药房服务: 604-707-2580