



BC Centre for Disease Control
An agency of the Provincial Health Services Authority

655 West 12th Avenue
Vancouver, BC V5Z 4R4

604.707.2443
604.707.2441

www.bccdc.ca

Clinical Prevention Services –
STI Control

604.707.5600
604.707.5604

www.SmartSexResource.com

AMOXICILINA

AMOXICILLIN

La amoxicilina es un antibiótico que se toma por vía oral para el tratamiento de ciertas infecciones de transmisión sexual (ITS).

Alergias (Allergies)

- Informe a su proveedor de atención médica si tiene alergia a algún antibiótico a base de penicilina, como la amoxicilina o la penicilina V-K, o a algún antibiótico a base de cefalosporina, como la cefixima (Suprax®), la cefalexina (Keflex®), el cefaclor (Ceclor®) u otros de esta categoría de fármacos.

Embarazo y lactancia (Pregnancy and Breastfeeding)

- La amoxicilina puede usarse durante el embarazo y la lactancia. Consulte a su proveedor de atención médica.

ADVERTENCIA (CAUTION)

- Deje pasar 24 horas o más entre la administración de la última dosis de amoxicilina y la vacuna viva oral contra la tifoidea (Vivotif®).
- **Interacciones medicamentosas:** tenga en cuenta que este documento ya no incluye las interacciones medicamentosas individuales. Hable con su proveedor de atención médica si toma algún producto recetado, de venta libre, a base de hierbas o recreativo.

Efectos secundarios (Side effects)

- Es posible que presente salpullido, dolor de cabeza, diarrea, náusea o vómito.
- Busque atención médica urgente si presenta alguna de las siguientes señales de una reacción alérgica: urticaria, dificultad para respirar e hinchazón de la cara, los labios, la lengua y la garganta.

Instrucciones para su uso (Instructions for Taking)

- Tome el medicamento con o sin alimentos hasta que se lo termine. Siga las instrucciones de dosificación de su proveedor de atención médica.
- Si se le olvida tomar una dosis, tómela tan pronto como lo recuerde, pero si ya casi es hora de tomar la siguiente dosis, omita la dosis que olvidó. No tome una dosis doble.

Amoxicilina (continuación)

Amoxicillin (cont'd)

Instrucciones de almacenaje (Storage Instructions)

- Almacenar a temperatura ambiente entre 15 y 30°C.
- Proteger de la luz, el calor y la humedad.
- No consumir los medicamentos después de la fecha de caducidad impresa.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

Instrucciones especiales (Special Instructions)

- No tenga relaciones sexuales:
 - Hasta que haya completado su tratamiento **y**
 - Hasta que su(s) pareja(s) sexual(es) también haya(n) recibido tratamiento y haya pasado una semana desde el inicio de su tratamiento, aunque los resultados de su prueba sean negativos.
- Tendrá que volver a recibir tratamiento si tiene relaciones sexuales con una pareja que no haya recibido tratamiento, o si tiene relaciones sexuales antes de que su tratamiento o el de su pareja hayan terminado. Consulte a su proveedor de atención médica.
- **Prueba de cura:** si su proveedor de atención médica le recetó amoxicilina para tratar la clamidia o la gonorrea, se recomienda que **repita la prueba de 3 a 4 semanas después de completar el tratamiento para asegurarse de que la infección haya desaparecido.**

Si tiene alguna pregunta o si necesita información adicional, visite <http://www.smartsexresource.com> o comuníquese con su proveedor de atención médica.