



BC Centre for Disease Control
Provincial Health Services Authority

Provincial Tuberculosis Services

Main Switchboard
TB Services Fax

www.bccdc.ca

604 707 2692
604 707 2690

CLOFAZIMINA CLOFAZIMINE

La clofazimina es un antibiótico utilizado para tratar la tuberculosis (TB), la lepra y otras infecciones relacionadas.

¿Cuándo debo tomarlo? (When should I take this?)

- Tómelo con alimentos o leche para ayudar a la absorción y reducir las molestias estomacales.
- Tome este medicamento a la misma hora todos los días. Esto le ayudará a recordar tomarlo.

¿Cómo debo tomarlo? (How should I take this?)

- Es muy importante que tome la clofazimina con regularidad.
- Tómela según las instrucciones de su médico.

¿Qué debo hacer si se me olvida tomar una dosis? (What should I do if I miss a dose?)

- Si se le olvida tomar una dosis, tómela tan pronto como lo recuerde. Pero si ya casi es hora de tomar la dosis del siguiente día, omita la dosis que olvidó.
- **No tome una dosis doble.**

Informe a su médico, enfermera o farmacéuta si está **tomando cualquier otro medicamento**, lo que incluye productos de venta libre (que no requieren de receta).

Evite la **exposición excesiva a la luz solar** o a la luz de rayos UV artificiales (p. ej., lámparas solares o camas de bronceado) mientras toma este medicamento. La clofazimina puede hacer que se vuelva más sensible al sol. Utilice un filtro solar y use ropa protectora.

¿Cuáles son algunos de los posibles efectos secundarios? (What are some possible side effects?)

- Náusea, vómito y diarrea
- Mareo o somnolencia
- Resequedad en la piel o en los ojos
- Comezón

CLOFAZIMINA (continuación) CLOFAZIMINE (cont'd)

Precaución (Caution): Llame a su médico o enfermera de inmediato si presenta los siguientes síntomas:

- Cansancio o debilidad inusuales
- Náusea o vómito persistentes
- Coloración amarilla en la piel o los ojos (podría ser anaranjada si ya tiene una descoloración entre roja y negra parduzca)
- Dolor abdominal o estomacal intenso
- Heces con sangre o negras y alquitranadas
- Desmayo o frecuencia cardíaca irregular
- Sarpullido
- Cambios en el estado de ánimo

Informe a su médico si presenta algún síntoma inusual que no se haya mencionado en esta hoja informativa.

Este medicamento puede hacer que sus líquidos corporales, como lágrimas, saliva, sudor, orina, heces, la superficie del ojo y el recubrimiento de sus párpados, adquieran una **coloración entre roja y negra parduzca**. También podría descolorar la piel a un tono entre rojo y negro parduzco. Esto es inofensivo y reversible, pero podría tardar algo de tiempo en volver a la normalidad después de terminar el tratamiento.

¿Qué otra cosa debo saber sobre la clofazimina? (What else do I need to know about taking clofazimine?)

- Informe a su médico o enfermera si está **embarazada**, si planea quedar embarazada o si desea **amamantar** a su bebé.
- Informe a su médico o enfermera si utiliza lentes de contacto blandos.

¿Dónde debo almacenar este medicamento? (Where should I store this medication?)

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Proteger de la luz.
- Cápsulas: almacenar a temperatura ambiente en un envase bien cerrado en un lugar fresco y seco.

¿A dónde llamo si tengo alguna otra pregunta? (Where do I call if I have any other questions?)

A su médico, clínica o unidad de salud pública: _____
Clínica de servicios para la TB en Vancouver: 604-707-2692
Clínica de servicios para la TB en New Westminster: 604-707-2698
Servicio de farmacia y vacunas del Centro de Control de Enfermedades de la Colombia Británica (BCCDC): 604-707-2580