



BC Centre for Disease Control
Provincial Health Services Authority

Provincial Tuberculosis Services

Main Switchboard
TB Services Fax

www.bccdc.ca

604 707 2692
604 707 2690

ISONIAZIDE ISONIAZID

L'isoniazide est un antibiotique prescrit pour prévenir ou traiter la tuberculose (la TB).

Quand faut-il en prendre? (When should I take this?)

- Prenez la dose à jeun 1 heure avant ou 2 heures après les repas.
- Prenez ce médicament tous les jours à la même heure. Ceci vous permettra de ne pas l'oublier.

Comment faut-il le prendre? (How should I take this?)

- Il est très important que vous preniez l'isoniazide régulièrement.
- Suivez la posologie recommandée par votre médecin.

Que faire si je manque une dose? (What should I do if I miss a dose?)

- Si vous oubliez une dose, prenez-la dès que vous vous en souvenez. Toutefois, s'il est presque l'heure de prendre la dose du lendemain, sautez la dose manquée.
- **Ne prenez pas une double dose.**

Que faut-il éviter lors de la prise de ce médicament? (Is there anything I should avoid when taking this?)

- L'alcool.
- Les antiacides à base d'aluminium ou de magnésium. Attendez au moins **1 heure après** la prise de l'isoniazide.

Si vous **prenez d'autres médicaments**, y compris un médicament en vente libre (obtenu sans ordonnance), parlez-en à votre médecin, infirmier(ère) ou pharmacien(ne).

Quels sont les effets secondaires potentiels? (What are some possible side effects?)

- Avertissez votre médecin, si vous éprouvez des **brûlures, des engourdissements ou des fourmillements** dans les mains ou les pieds.

ISONIAZIDE (suite) ISONIAZID (cont'd)

Mise en garde (Caution) : Appelez votre médecin ou infirmier(ère) immédiatement en présence des symptômes suivants :

- fatigue ou faiblesse inhabituelles;
- fièvre;
- perte d'appétit;
- nausée (envie de vomir);
- maux d'estomac ou diarrhée;
- urines foncées;
- peau ou yeux jaunâtres; ou
- éruption cutanée.

Avisez votre médecin si vous éprouvez des symptômes inhabituels ne figurant pas dans ce feuillet d'information.

Que faut-il savoir de plus sur la prise de l'isoniazide? (What else do I need to know about taking Isoniazid?)

- Avisez votre médecin si vous avez une maladie du foie.
- Il est important que vous alliez faire tous les **examens de laboratoire** prescrits par votre médecin et que vous vous rendiez à tous les rendez-vous prévus avec votre médecin ou infirmier(ère).
- Prévenez votre médecin ou votre infirmier(ère) si vous êtes **enceinte**, envisagez une grossesse ou si vous souhaitez **allaier** votre enfant.

Où faut-il conserver ce médicament? (Where should I store this medication?)

- Ne le laissez pas à la portée des enfants.
- Protégez-le de la lumière.
- Sous forme de comprimé ou de sirop : conservez-le à température ambiante dans un endroit frais et sec.

Qui faut-il appeler si j'ai d'autres questions? (Where do I call if I have any other questions?)

Votre médecin, clinique ou bureau de santé publique : _____

La clinique des services chargés de la tuberculose à Vancouver : 604-707-2692

La clinique des services chargés de la tuberculose à New Westminster : 604-707-2698

Les services de vaccinations et de pharmacie du BCCDC : 604-707-2580