



BC Centre for Disease Control  
Provincial Health Services Authority

Provincial Tuberculosis Services

Main Switchboard  
TB Services Fax

604 707 2692  
604 707 2690

www.bccdc.ca

Simplified Chinese

## 莫西沙星 MOXIFLOXACIN

莫西沙星是一种用于治疗细菌感染（包括结核病）的抗生素。

### 我该什么时间服用此药 (When should I take this)?

- 莫西沙星可在餐前或餐后服用。
- 用8盎司 (= 240毫升) 的一整杯水。
- 整片吞服。不要掰开、咬碎或咀嚼药片。
- 在每天同一时间服用。这有助于您记得服药。
- 一天当中喝多杯水。
- 

### 我该如何服用此药 (How should I take this)?

- 严格按医嘱服用莫西沙星非常重要。

### 如果漏服一次, 我该怎么办 (What should I do if I miss a dose)?

- 如果漏服一次, 请在想起时尽快服用。但是, 如果快到该服第二天的剂量时, 则不必补服。
- 请勿服用双倍剂量。

### 服用此药有无禁忌 (Is there anything I should avoid when taking this)?

- 应在服用以下药物至少**4小时前**或**8小时后**服用莫西沙星:
  - 含铝和/或镁的抗酸剂。(Maalox®、Mylanta®)
  - 硫糖铝 (溃疡药)
  - 含铁或锌的补充剂。

在服用莫西沙星前, 务必告诉医生、护士或药剂师您正在服用的所有药物 (包括非处方药)。在咨询医生或药剂师之前, 切勿开始服用新药物。

### 可能有哪些副作用 (What are some possible side effects)?

副作用并不常见, 通常很轻微, 可包括:

- 恶心、呕吐、腹泻
- 头痛
- 头晕目眩

Last reviewed by BCCDC Pharmacy February 2022

Page 1 of 2

## 莫西沙星 MOXIFLOXACIN

**警告 (Caution):** 如果您出现以下症状, 请立即致电您的医生或护士:

- 皮疹、荨麻疹或呼吸困难
- 心跳不规则或胸痛
- 肌肉、肌腱或关节疼痛
- 手或脚疼痛、灼痛、刺痛、麻木、无力
- 皮肤或眼白发黄
- 视力改变或障碍
- 血性或水性腹泻
- 任何其他持续的副作用

如果您出现此信息表中未提及的任何异常症状, 请告诉医生。

莫西沙星可导致头晕目眩。在开车、操作机器或进行危险活动或需要精神警觉或协调的工作时要小心。

莫西沙星可导致皮肤容易晒伤。避免过度接触阳光或人造紫外线(如晒黑床、太阳灯)。使用防晒霜或穿防护服。

糖尿病患者服用此药期间要定期检查血糖水平。

如果您怀孕、计划怀孕或希望用母乳喂养宝宝, 请告诉医生。

**这种药物应如何存放 (Where should I store this medication)?**

- 谨防儿童接触
- 片剂: 在室温(15° C至30° C)下储存在密闭容器中。避免热源和直射光。储存在阴凉、干燥处。

**如果我有其他问题, 应该给谁打电话(Where do I call if I have any other questions)?**

您的医生、诊所或公共卫生单位: \_\_\_\_\_

温哥华结核病服务诊所: 604-707-2692

新西敏市结核病服务诊所: 604-707-2698

BC省疾病控制中心疫苗与药房服务: 604-707-2580