



BC Centre for Disease Control
Provincial Health Services Authority

Provincial Tuberculosis Services

Main Switchboard
TB Services Fax

604 707 2692
604 707 2690

www.bccdc.ca

RIFAMPINA RIFAMPIN

La rifampina es un antibiótico que se utiliza en la prevención y el tratamiento de la tuberculosis (TB) y otras infecciones relacionadas.

¿Cuándo debo tomarlo? (When should I take this?)

- Tómelo con el estómago vacío, 1 hora antes o 2 horas después de los alimentos.
- Tome este medicamento a la misma hora todos los días. Esto le ayudará a recordar tomarlo.

¿Cómo debo tomarlo? (How should I take this?)

- Es muy importante que tome este medicamento con regularidad.
- Tómelo según las indicaciones de su médico.

¿Qué debo hacer si se me olvida tomar una dosis? (What should I do if I miss a dose?)

- Si se le olvida tomar una dosis, tómela tan pronto como lo recuerde. Pero si ya casi es hora de tomar la dosis del siguiente día, omita la dosis que olvidó.
- **No tome una dosis doble.**

¿Hay algo que deba evitar mientras lo tomo? (Is there anything I should avoid when taking this?)

- El alcohol

Antes de tomar **RIFAMPINA**, asegúrese de informar a su médico, enfermera o farmacéuta todos los medicamentos (incluidos aquellos que no requieren de receta) que está tomando. NO empiece a tomar un nuevo medicamento sin consultar a un médico o a un farmacéuta.

¿Cuáles son algunos de los posibles efectos secundarios? (What are some possible side effects?)

- Náusea, acidez estomacal
- Mareo o dolor de cabeza

Precaución (Caution): Llame a su médico o enfermera de inmediato si presenta los siguientes síntomas:

- Cansancio o debilidad inusuales
- Fiebre
- Pérdida del apetito
- Náusea (necesidad de vomitar)

RIFAMPINA (continuación) RIFAMPIN (cont'd)

- Dolor estomacal o diarrea
- Orina oscura
- Coloración amarilla en la piel o en la parte blanca de los ojos
- Dolor en la boca o en la lengua
- Hematomas en la piel
- Sarpullido
- Cualquier otro efecto secundario persistente

Informe a su médico si presenta algún síntoma inusual que no se haya mencionado en esta hoja informativa.

Este medicamento podría hacer que sus lágrimas, dientes, saliva, esputo, sudor, orina y heces adquieran un **color rojo-naranja**. Esto es inofensivo pero podría manchar permanentemente sus lentes de contacto blandos.

La rifampina puede disminuir la eficacia de las píldoras anticonceptivas. Use un método alternativo de control natal (un método de barrera, p. ej., condones, diafragmas). Continúe utilizando el método de barrera durante por lo menos 28 días después de suspender la rifampina. Reduzca a 4 días el número de días libres de hormonas de sus píldoras anticonceptivas.

Es importante que se realice todas las pruebas de laboratorio que ordene su médico y que asista a todas las citas con su médico o enfermera.

Informe a su médico si está **embarazada**, si planea quedar embarazada o si desea **amamantar** a su bebé.

¿Dónde debo almacenar este medicamento? (Where should I store this medication?)

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Proteger de la luz.
- Cápsulas: almacenar a temperatura ambiente (entre 15 °C y 30 °C) dentro de un recipiente bien cerrado en un lugar fresco y seco.
- Suspensión: refrigerar. Agitar bien antes de usar.

¿A dónde llamo si tengo alguna otra pregunta? (Where do I call if I have any other questions?)

A su médico, clínica o unidad de salud pública: _____

Clínica de servicios para la TB en Vancouver: 604-707-2692

Clínica de servicios para la TB en New Westminster: 604-707-2698

Servicio de farmacia y vacunas del Centro de Control de Enfermedades de la Colombia Británica (BCCDC): 604-707-2580