



BC Centre for Disease Control  
Provincial Health Services Authority

Clinical Prevention Services  
Provincial STI/HIV Clinic

655 West 12th Avenue  
Vancouver, BC V5Z 4R4

Tel 604.707.5600  
Fax 604.707.5604

www.bccdc.ca  
www.SmartSexResource.com

## 氟康唑 Fluconazole

氟康唑 (CanesOral®, Diflucan®) 是用于治疗某些真菌皮肤感染的口服抗真菌药物，包括外阴阴道念珠菌病和酵母菌龟头炎，这些都是念珠菌菌种引起的酵母菌感染。

有关用酵母菌乳膏和/或阴道插入物治疗的信息，请另外参阅药品宣传材料：[酵母菌和真菌感染](#)。

### 过敏(Allergies)

- 如果您对任何唑类抗真菌药物过敏，如氟康唑 (CanesOral®、Diflucan®)、伊曲康唑 (Sporanox®)、酮康唑、泊沙康唑 (Posanol®)、伏立康唑(Vfend®)，请告知医务人员。

### 怀孕/哺乳 (Pregnancy and Chest/Breastfeeding)

- 怀孕期间不建议使用氟康唑。请咨询医务人员。
- 哺乳期间可谨慎使用氟康唑。请咨询医务人员。

### 警告 (CAUTION)

- 药物相互作用：**如果您在服用任何处方药、非处方药、草药或消遣娱乐产品，请告知医务人员。本文件未一一列出各种药物的相互作用。
- 请注意：**如果您已在定期使用氟康唑，请勿使用此一次性口服氟康唑治疗。

### 副作用 (Side effects)

- 您可能会出现恶心、呕吐、腹泻、腹痛、头痛或皮疹。
- 如果您出现任何严重的皮肤反应，请立即联系医务人员。

### 服药说明 (Instructions for Taking)

- 饭前或饭后口服片剂或胶囊。
- 服用氟康唑前，请仔细阅读包装说明书。

## 氟康唑（续） Fluconazole (cont'd)

### 贮存说明 (Storage Instructions)

- 贮存于 15-30°C 室温下。
- 避光、防高温、防潮。
- 药物超出印明的失效日期，切勿使用。
- 谨防儿童接触。

### 特殊说明 (Special Instructions)

- 如果治疗后症状持续，请告知医务人员。
- 没有出现症状的性伴侣无需治疗。

如果您有疑问或需要更多信息，  
请访问 [www.smartsexresource.com](http://www.smartsexresource.com) 或联系医务人员。