

# لقاحات كوفيد-19 للأطفال المتراوحة أعمارهم بين 5 إلى 11 عامًا

نُشر في آذار/مارس 2022

يُمكن لهذه المعلومات أن تساعدك في  
اتخاذ أفضل قرار لك ولطفلك.



ما يزيد عن مليون و600 ألف طفل أعمارهم 5-11 عامًا تلقوا لقاح  
كوفيد-19 في كندا.

ويتلقى المزيد من الأطفال اللقاح يوميًا.

## كيفية عمل اللقاحات

تُعلم اللقاحات جهازنا المناعي كيفية التعرف على فيروس  
كوفيد-19 ومحاربته.

- 1 يعطي اللقاح تعليمات إلى خلايانا حول كيفية بناء جزءٍ غير  
ضار من الفيروس.
- 2 يعرف جهاز المناعة لدينا أن هذا الجزء لا ينتمي إلى ذلك  
المكان ويصنع أجسامًا مضادة.
- 3 إذا تعرضنا إلى الفيروس، يكون لدى جسمنا الآن الأدوات  
لمحاربته بدون إصابتنا الشديدة بالمرض.

## لقاح كوفيد-19 للأطفال

بمقدور أي شخص يبلغ عمره 5 سنوات أو أكثر الحصول على  
لقاح كوفيد-19 مجانًا في بريتش كولومبيا.

- اعتمد لقاح فايزر-بايونتك للأطفال المتراوحة أعمارهم بين  
11-5 عامًا.
- اعتمد لقاح موديرنا للأطفال المتراوحة أعمارهم بين 6-11.
- يحصل الأطفال على جرعة أصغر من البالغين. هذا يشبه بعض  
اللقاحات الأخرى للأطفال الأصغر سنًا.
- تحققت وزارة الصحة في كندا من بيانات اللقاحات بدقة للتأكد  
من سلامتها وفعاليتها.

## كوفيد-19 لدى الأطفال

تظهر أعراض طفيفة على معظم الأطفال المُصابين بكوفيد-19. قد تظهر عليهم الحمى والسعال،  
أو قد لا تظهر الأعراض. ولكن يُمكن لبعض الأطفال أن يمرضوا بشدة.

## المرض الخطير بسبب كوفيد-19

دخل ما يزيد عن 100 طفل في بريتش كولومبيا المستشفى  
بسبب إصابتهم بكوفيد-19.

(بيانات مركز بريتش كولومبيا لمكافحة الأمراض اعتبارًا من شباط/فبراير 2022)

يُمكن للأطفال أن يصابوا بالتهاب الرئتين الحاد ومشاكل في  
القلب مثل التهاب عضلة القلب بسبب كوفيد-19. حالات  
الموت بسبب كوفيد-19 عند الأطفال بين 5-11 عامًا نادرة جدًا.

يرتفع احتمال الإصابة بالمرض الشديد عند الأطفال غير  
المُطعمين بالكامل أو أولئك الذين يعانون من حالات مرضية  
محددة.

## الآثار طويلة الأجل لكوفيد-19

قد تمتد الأعراض عند بعض الأطفال لأسابيع أو أشهر بعد  
إصابتهم بكوفيد-19.

يُمكن أن تشمل الأعراض طويلة الأجل الصداع، والتعب  
والصعوبة في التركيز.

متلازمة التهاب المتعدد الأجهزة عند الأطفال (MIS-C) هي  
حالة نادرة ولكنها خطيرة يُمكن أن تحدث بعد أسابيع من  
الإصابة بكوفيد-19.

- يُمكن لأعضاء مختلفة أن تصاب بالالتهاب.
- يحتاج معظم الأطفال إلى الرعاية في المستشفى،  
ولكن يُمكن أن يتحسنوا مع العلاج.

# لقاحات كوفيد-19 للأطفال المتراوحة أعمارهم بين 5 إلى 11 عامًا

نُشر في آذار/مارس 2022

## فوائد اللقاح

### تفاعلات آمنة

يُمكن للقاحات أن تُقلل من احتمال غياب الأطفال عن النشاطات المهمة، مثل المدرسة والرياضة والفعاليات الاجتماعية.



### تجنّب الإصابة بالمرض الشديد

تساعد اللقاحات في حماية الأطفال من الإصابة بالمرض الشديد بسبب كوفيد-19، حتى لو كانوا قد أصيبوا بكوفيد-19 من قبل، فيُمكن للقاح تقديم استجابة مناعية أقوى وأطول.



زاد احتمال دخول الأطفال المتراوحة أعمارهم بين 5-11 عامًا غير المُطعمين 1,8 مرة عن الأطفال المُطعمين الذين حصلوا على جرعة واحدة من لقاح فايزر على الأقل.

1,8 مرة

(بيانات مركز بريتش كولومبيا لمكافحة الأمراض من 15 كانون الأول/ديسمبر حتى 12 شباط/فبراير 2022)

## سلامة اللقاح

تتم متابعة كميات هائلة من البيانات حول السلامة بينما يتلقى ملايين الأطفال اللقاح.

### حالات خطيرة نادرة

حالات الخطر على السلامة مثل تفاعلات الحساسية أو التهاب عضلة القلب نادرة الحدوث للغاية.

حصل الأطفال الذين أصيبوا بحالات خطيرة على العلاج وتعافوا بسرعة.

إن خطر دخول الأطفال إلى المستشفى إذا أصيبوا بكوفيد-19 يفوق أي آثار نادرة للقاح بشكل كبير.

مراقبة سلامة اللقاح جارية باستمرار.

### آثار جانبية شائعة

قد يعاني الأطفال من آثار جانبية طفيفة بعد تلقيهم اللقاح والتي يمكن أن تستمر 1-3 أيام، بما في ذلك:



آلام في الجسم



الإرهاق أو التعب



ألم في الذراع

هذه آثار طبيعية وتُبين أن جهاز المناعة لديهم يقوم بعمله.