

واکسن COVID-19 برای کودکان 5 تا 11 ساله

منتشر شده در مارس 2022

با کمک این اطلاعات می‌توانید بهترین تصمیم را برای خود و فرزند خود بگیرید.



بیش از 1.6 میلیون کودک 5 تا 11 ساله واکسن COVID-19 را در کانادا تزریق کرده‌اند.

روزانه کودکان بیشتری برای تزریق واکسن مراجعه می‌کنند.

نحوه عملکرد واکسن‌ها چگونه است

این واکسن‌ها به سیستم ایمنی ما می‌آموزند که چگونه ویروس COVID-19 را شناسایی کرده و با آن مبارزه کند.

- 1 واکسن به سلول‌های ما آموزش می‌دهد که چگونه بخشی بی‌ضرری از ویروس را بسازد.
- 2 دستگاه ایمنی بدن ما تشخیص می‌دهد که این بخش نباید در این قسمت از بدن باشد و آنتی‌بادی می‌سازد.
- 3 اگر در معرض ویروس قرار بگیریم، اینک بدن ما بدون اینکه خیلی بیمار شود ابزاری برای مبارزه با آن دارد.

واکسن COVID-19 برای کودکان

تمامی افراد 5 ساله و بزرگتر می‌توانند به صورت رایگان واکسن‌های COVID-19 را در بریتیش کلمبیا دریافت کنند.

- واکسن فایزر-بایون‌تک برای تزریق به کودکان بین 5 تا 11 سال تأیید شده است.
- واکسن Moderna برای کودکان 6 تا 11 ساله تأیید شده است.
- کودکان دوز کمتری نسبت به بزرگسالان دریافت می‌کنند. این واکسن مشابه برخی از واکسن‌های دیگر برای کودکان کوچکتر است.
- Health Canada اطلاعات واکسن‌ها را به دقت بررسی کرده است تا مطمئن شود که ایمن و موثر هستند.

COVID-19 در کودکان

بیشتر کودکانی که به COVID-19 مبتلا می‌شوند علائم خفیفی دارند. آنها ممکن است تب و سرفه داشته باشند یا اصلاً علائمی در آنها مشاهده نشود. اما برخی کودکان به نوع شدید بیماری مبتلا می‌شوند.



عوارض بلند مدت COVID-19

علائم برخی از کودکان ممکن است هفته‌ها یا ماه‌ها پس از COVID-19 ادامه داشته باشد.

علائم طولانی مدت می‌تواند شامل سردرد، خستگی و مشکل در تمرکز باشد.

سندروم التهابی چند دستگاهی کودکان (MIS-C) مشکلی نادر اما جدی است که احتمال بروز آن هفته‌ها بعد از ابتلا به COVID-19 وجود دارد.

- امکان التهاب دستگاه‌های مختلف بدن وجود دارد.
- بیشتر کودکان باید بستری شوند اما به کمک درمان بهبود می‌یابند.

بیماری خطرناک ناشی از COVID-19

بیش از 100 کودک در بریتیش کلمبیا به دلیل COVID-19 در بیمارستان بستری شده‌اند.

(اطلاعات مربوط به BCCDC در فوریه 2022)

در کودکان ریه ممکن است به شدت عفونت کند و مشکلات قلبی مثل میوکاردیت ناشی از COVID-19 مشاهده شود. مرگ و میر ناشی از COVID-19 در کودکان 5 تا 11 ساله بسیار نادر است.

در کودکانی که به طور کامل واکسینه نشده‌اند یا شرایط پزشکی خاصی دارند احتمال ابتلا به بیماری شدید بیشتر است.

مزایای تزریق واکسن

زندگی با آسایش

واکسن‌ها باعث می‌شوند که کودکان فعالیت‌های مهم مانند مدرسه، ورزش و رویدادهای اجتماعی را از دست ندهند.



مبتلا نشدن به نوع شدید بیماری

واکسن‌ها از ابتلای کودکان به نوع شدید بیماری COVID-19 جلوگیری می‌کنند.

حتی در صورتی که کودک قبلاً به COVID-19 مبتلا شده باشد، تزریق واکسن قدرت و مدت پاسخ ایمنی را بیشتر می‌کند.



احتمال بستری شدن کودکان 5 تا 11 ساله واکسینه نشده از کودکان واکسینه شده‌ای که با حداقل یک دوز واکسن Pfizer واکسینه شده‌اند، 1.8 برابر بیشتر است.

(اطلاعات BCCDC از 15 دسامبر 2021 تا 12 فوریه 2022)

1.8x

ایمنی واکسن

هم‌زمان با تزریق واکسن به میلیون‌ها کودک، اطلاعات زیادی در زمینه بی‌خطر بودن واکسن‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرند.

عوارض جدی و نادر

ابتلا به عوارض جدی مثل حساسیت یا میوکاردیت بسیار نادر است.

کودکانی که عوارض جدی داشتند تحت درمان قرار گرفتند و به سرعت بهبود یافتند.

در صورت ابتلای کودکان به COVID-19، خطر بستری شدن در بیمارستان بسیار بیشتر از عوارض نادر واکسن است.

بی‌خطر بودن واکسن‌ها به صورت دائمی تحت نظارت قرار دارد.

عوارض جانبی رایج

بعد از تزریق واکسن احتمال اینکه عوارض خفیفی در کودکان به مدت 1 تا 3 روز مشاهده شود وجود دارد که می‌توان به این موارد اشاره کرد:



احساس درد در بدن



احساس کوفتگی یا خستگی



احساس درد در بازو

این علائم طبیعی هستند و تنها نشان دهنده این موضوع است که سیستم ایمنی فعال شده است.

اطلاعات بیشتر

در نشانی bccdc.ca/covid19vaccinechildren

موجود است

کودک خود را واکسینه کنید

همین حالا ثبت نام کنید

gov.bc.ca/vaccineforkids-FAR

یا با شماره 1-833-838-2323 تماس بگیرید

سوالات بیشتری دارید؟

از پزشک، پرستار یا داروساز خود

درخواست کمک کنید یا با شماره

1-833-838-2323 تماس بگیرید.