

어린이용 백신

만 6개월~11세



BC Centre for Disease Control
Provincial Health Services Authority

부모님이 아셔야 할 사항

- 캐나다 보건부는 어린이용 mRNA 백신 두 가지를 승인했습니다.
 - 모더나 백신은 만 6개월~11세 어린이용입니다.
 - 화이자-바이오엔테크 백신은 만 5~11세 어린이용입니다.
- 이 백신들은 자녀를 중증 COVID-19에서 보호하는 데 도움이 됩니다. 백신 접종을 받은 어린이는 입원 가능성이 훨씬 작습니다.
- 수백만 명의 어린이가 백신을 안전하게 맞았습니다. 부작용은 대개 가벼우며 1~3일 지속합니다. 심각한 이상 반응은 극히 드물며 신속하게 치료됩니다.
- **백신 접종 등록 시스템으로 등록하세요.** 자녀가 1차와 2차 접종을 받을 때가 되면 통지를 받습니다.

자녀가 왜 백신을 맞아야 하나요?

COVID-19에 걸리는 대부분 어린이는 가볍게 앓지만, 일부는 중병을 앓으며, 병원 진료가 필요할 수 있습니다. 건강 문제가 몇 주나 몇 달 지속하는 아이들도 있습니다. 백신은 중증 COVID-19 예방에 도움이 됩니다.

누가 자격이 있나요?

만 6개월 이상 어린이는 누구나 COVID-19 백신을 맞을 수 있습니다. 백신은 무료입니다.

- 어린이 백신 접종에는 BC 케어 카드가 필요하지 않습니다.
- 부모 중 한 명이나 법적 보호자, 그 외 양육자(예: 아이를 키우는 친척)가 동의하여야 합니다.



백신 접종 방법

백신 접종 등록 시스템으로 등록하세요.

온라인: getvaccinated.gov.bc.ca

전화: 1-833-838-2323

자녀가 접종을 받을 때가 되면 예약 안내 통지를 받습니다. 2차 접종은 다시 등록하지 않으셔도 됩니다.

용량과 시기

어린이는 COVID-19 백신을 8주 간격으로 2회 접종하는 것이 권장됩니다.



- 어린이와 아기는 만 12~17세 청소년과 성인보다 **더 적은 용량**을 맞아야 같은 수준으로 보호됩니다.
- 자녀는 COVID-19 백신을 독감 주사 등 다른 아동기 백신과 동시에 맞아도 됩니다.

자세한 사항

- BCCDC - [어린이와 백신](#), [COVID-19 데이터](#)
- 백신의 효과 - [ImmunizeBC](#)
- 어린이를 위한 백신 교육 - [어린이 면역 강화](#)
- 백신 검사와 승인 - [캐나다 보건부](#)

어린이용 백신

만 6개월~11세



BC Centre for Disease Control
Provincial Health Services Authority

접종 전

자녀에게 알려주세요 - 학령기 자녀는 백신 접종을 하루 전에 알려주셔야 합니다. 취학 전 자녀는 접종 직전에 알려주셔야 합니다.

질문에 답해주세요 - 자녀에게 질문하라고 하세요. 예약 당일에 무슨 일이 있을지 자녀가 이해하고 마음을 편하게 하는 것이 중요합니다.

긴장에 대비하세요 - 학령기 자녀를 도우려면 [CARD 시스템](#)을 사용해보세요: 안정/질문/이완/다른 것에 집중



- 자녀가 주삿바늘을 불안해하면 간단한 호흡법을 가르쳐 진정하게 하세요. BC 어린이 병원에서 개발한 [복식 호흡 게임](#)을 시켜보세요.
- [제시 곰의 백신 이야기](#)와 [색칠 페이지](#)를 이용하세요. HealthLinkBC에는 자녀의 백신 준비에 관한 [자세한 정보](#)가 있습니다.

접종 당일

- [무통 크림이나 붙이는 패치가 도움이 될 수 있습니다.](#) 이런 제품은 대부분 약국에서 처방전 없이 살 수 있습니다. 접종 한 시간 전에 바르거나 붙이세요.
- "곧 끝나", "괜찮을 거야" 같은 말은 아이가 오히려 주삿바늘에 신경을 써 스트레스를 더 받을 수 있으니 하지 마세요. 대신, 장난감이나 가벼운 대화, 호흡법으로 **자녀의 주의를 다른 데로 돌려보세요.**
- 아이를 **무릎에 앉혀 단단히 안아** 진정시키면 가만히 있을 수 있습니다.
- 백신 클리닉의 의료 제공자는 어린이 다루는 교육을 받았으므로 아이를 도울 수 있습니다.



접종 후

- 자녀에게는 백신 접종 후 팔 통증, 피로, 몸살 등 **가벼운 부작용**이 있을 수 있습니다. 이런 경우는 흔하며, 대개 1~3일 후에 사라집니다.



- 접종 후 15분간 대기하면서 드물지만 심각한 이상 반응이 나타나면 의료 제공자가 치료할 수 있게 하세요.
- 백신 접종 후 가슴 통증, 숨참 같은 증상이 있으면 치료를 받거나 911에 전화하세요.