


앞으로 며칠 사이에 예상되는 증상

있을 수 있는 부작용

COVID-19 백신을 맞고 하루나 이틀이 지나면 부작용이 흔히 있습니다. 다음 부작용이 있을 수 있습니다.



**통증이나
빨개짐, 가려움, 부기**
접종 후 즉시 및/또는
7일 후



**겨드랑이 림프절이
부음**



**피로 또는
두통**



발열과 오한



**근육통 또는
관절통**



**메스꺼움과
구토**

부작용 관리

통증 부위: 차가운 젖은 천이나 천으로 싼 얼음 팩을 대세요.

부작용에서 오는 불편감:

아세트아미노펜(Tylenol®)이나 이부프로펜(Advil®) 같은 약을 복용하세요. ASA (예: Aspirin®)는 만 18세 미만 미성년자가 복용하면 안 됩니다. 임신한 경우 이부프로펜(Advil®)을 사용하지 마세요. 대신 Tylenol®로 불편감이나 열을 치료하세요.

대부분 부작용은 심하지 않으며 저절로 사라집니다.

주의하셔야 할 증상

- 백신의 일부 부작용은 COVID-19 증상과 비슷합니다. 백신 때문에 COVID-19에 걸리지는 않습니다.
- 인후통이나 콧물, 기침 같은 증상은 백신의 부작용이 아닙니다.
- COVID-19 증상이 어느 하나라도 있으면 다음 링크의 BC COVID-19 자가 평가 도구를 사용하세요:
- 걱정되시면 의료 제공자에게 연락하시거나 8-1-1로 전화하세요.
- 백신 접종 후 심각한 부작용은 드뭅니다. 심각한 부작용이나 심한 알레르기 반응 (두드러기, 얼굴이나 혀, 목구멍의 부기, 호흡 곤란 포함)이 나타나면 즉시 치료를 받으시거나 9-1-1로 전화하세요. COVID-19 백신을 맞았다고 알려주세요.

bc.thrive.health/covid19/ko

2차 백신 접종

- 1차 백신 접종을 받는 분들은 2차 접종 예약 시점이 될 때 이메일이나 문자, 전화로 예약 안내 통지를 받습니다. gov.bc.ca/getvaccinated의 백신 접종 등록 페이지에서 꼭 등록하세요. 1차 접종 후에도 등록할 수 있으며, 2차 접종 시점이 되면 안내 통지를 받습니다.
- 예방 접종 기록을 가져가세요. 접종 기록은 Health Gateway에서도 온라인으로 구할 수 있습니다. 여기서 등록하세요: www.healthgateway.gov.bc.ca

기억하셔야 할 사항

- 1차 접종 후 2~3주 지나야 바이러스에 대하여 면역성이 형성됩니다. 이 기간 전이나 도중에 COVID-19 감염자에게 노출되면 COVID-19에 여전히 걸릴 수 있습니다.
- COVID-19 백신의 안전성 모니터링에 참여를 요청하는 연락을 받으실 수도 있습니다. 자세한 사항은 다음 웹 사이트를 보세요: CANVAS-COVID.ca

백신 접종 후에도 공중 보건 지침을 계속 따르세요



2m(6피트) 거리를 유지하세요



손을 자주 씻으세요



마스크를 착용하세요

백신 접종 후 드문 부작용 사례

다음 증상 중 하나라도 있으시면

- 1 즉시 치료를 받으세요
- 2 COVID-19 예방 접종 기록을 가져가세요

아스트라제네카/코비실드 또는 얀센 백신

드문 사례인 심각한 혈전 및/또는 출혈이 보고되었습니다.

백신 접종 후 4~28일간 다음 증상을 모니터하세요.

- 심한 두통이 가시지 않음
- 발작
- 몸의 일부를 움직이기 어려움
- 눈이 침침하고 나아지지 않음
- 말하기 어려움
- 숨참
- 가슴 통증
- 심한 복통
- 팔이나 다리가 심하게 붓거나, 아프거나, 색이 변함
- 피부밑에 비정상적인 멍이 들거나, 빨갛거나 자줏빛 반점이 생기거나, 피 멧힌 물집이 생김

화이자 또는 모더나 백신

드문 사례인 심장 염증이 보고되었습니다.

백신 접종 후 7일간 다음 증상을 모니터하세요.

- 가슴 통증
- 숨참
- 심장이 빨리 뛰거나, 팔딱거리거나, 두근거리는 느낌이 들고 쉬어도 사라지지 않거나 다른 증상을 동반하지 않음