


接种后几天的预期事项：

可能的副作用

在接种新冠病毒疫苗后一两天，副作用很常见。其中可包括：



疼痛、发红、发痒或肿胀 接种后立即出现，也可能7天后出现。



腋下淋巴结肿大



疲倦或头痛



发热发冷



肌肉或关节酸痛



恶心呕吐

缓解副作用的提示

疼痛部位：放置一块凉的湿布或包裹的冰袋。

副作用造成的不适：服用对乙酰氨基酚 (Tylenol®) 或布洛芬 (Advil®) 等药物。不应给未满18岁者服用ASA (如Aspirin®阿司匹林)。如果您已怀孕，不要服用布洛芬 (Advil®)。可用泰诺®代替治疗不适或发烧。

大多数副作用并不严重，应会自行消失。

需要留意的症状

- 疫苗的一些副作用与新冠病毒的症状相似。疫苗不会导致或致使您患上新冠病毒。
- 喉咙痛、流鼻涕或咳嗽等症状不是疫苗的副作用。
- 如果您出现任何新冠病毒症状，请使用BC省新冠病毒自我评估工具，网址：
bc.thrive.health/covid19/en
- 如果您感到担忧，请联系您的医疗服务提供者或致电8-1-1。
- 接种疫苗后很少会出现严重副作用。如果您出现任何严重副作用或严重过敏反应 (包括荨麻疹、脸部、舌头或喉咙肿胀、或呼吸困难)，请立即就医或致电9-1-1。告诉医生您已接种了新冠病毒疫苗。

回来接种第二剂疫苗

- 接种第一剂疫苗的人在有资格预约第二剂疫苗时将会收到电子邮件、短信或电话通知。请务必在Get Vaccinated (疫苗接种) 网站注册,网址是: gov.bc.ca/getvaccinated。在接种第一剂后,您仍可以注册,并会在可以接种第二剂时接到通知。
- 请带上您的免疫接种记录。相关记录也将通过Health Gateway(健康网关)平台在线提供。注册地址: www.healthgateway.gov.bc.ca

需要牢记的事项

- 在接种第一剂疫苗后,大约需要两到三周时间来建立病毒免疫力。如果在此之前或在此期间接触到新冠病毒感染者,您仍然可能染上新冠病毒。
- 可能会联系您参与新冠病毒疫苗的安全监测。如需更多信息,请访问 CANVAS-COVID.ca

即使您接种了疫苗,也要继续遵守公共卫生指南



保持隔开2米
(6英尺) 距离



经常清洁
双手



戴口罩

接种疫苗后的罕见事件

如果您出现任何这些症状:

- 1 立即求医
- 2 带上您的新冠病毒疫苗接种记录

阿斯利康/COVISHIELD 或 杨森 (Janssen) 疫苗

已有出现严重血栓和/或出血的罕见病例报告。

在接种疫苗后的4到28天内,注意监测是否有以下症状:

- 严重头痛不退
- 痉挛
- 部分身体活动困难
- 视力模糊症状不消退
- 说话困难
- 呼吸短促
- 胸痛
- 严重腹痛
- 手臂或腿部新出现严重肿胀、疼痛或颜色改变
- 不正常的瘀伤、红斑或紫斑或皮下血泡

辉瑞或莫德纳 (Moderna) 疫苗

已有罕见的心脏炎症病例报告。

在接种疫苗后的7天内,注意监测是否有以下症状:

- 胸痛
- 呼吸急促
- 感觉心脏快速跳动、颤动或狂跳,休息后症状不消失或伴有其他症状