

ਤਪਦਿਕ ਦਾ ਰੋਕਥਾਮ ਨਾਲ ਇਲਾਜ Preventive Treatment for Tuberculosis

ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਦੇ ਤਪਦਿਕ ਦੇ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਤਪਦਿਕ ਦਾ ਕੀਟਾਣੂ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਪਦਿਕ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਐਕਟਿਵ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਤਪਦਿਕ ਦਾ ਕੀਟਾਣੂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ।

ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚੋਂ ਤਪਦਿਕ ਦਾ ਕੀਟਾਣੂ ਮਾਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ (ਐਕਟਿਵ) ਤਪਦਿਕ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੌਂ (9) ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਈਸੋਨਾਯਾਜ਼ਿਡ (ISONIAZID) ਲਵੋ। ਆਈਸੋਨਾਯਾਜ਼ਿਡ (ਆਈ.ਐਨ.ਐਚ) ਤਪਦਿਕ ਦਾ ਕੀਟਾਣੂ ਮਾਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਹੈ।

ਪਿਰਿਡਾਕਸਿਨ (PYRIDOXINE) ਵਿਟਾਮਨ ਬੀ₆ (B₆) ਦਾ ਰਸਾਇਣਕ ਨਮ ਹੈ। ਪਿਰਿਡਾਕਸਿਨ (ਵਿਟਾਮਨ ਬੀ₆) ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਜਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਉਸ ਸੁੰਨ ਅਤੇ ਝਰਨਾਹਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਆਈਸੋਨਾਯਾਜ਼ਿਡ ਲੈਣ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਮੈਨੂੰ ਆਈਸੋਨਾਯਾਜ਼ਿਡ ਅਤੇ ਪਿਰਿਡਾਕਸਿਨ (ਵਿਟਾਮਨ ਬੀ₆) ਕਿਵੇਂ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ?

- ਆਈਸੋਨਾਯਾਜ਼ਿਡ ਅਤੇ ਪਿਰਿਡਾਕਸਿਨ (ਵਿਟਾਮਨ ਬੀ₆) ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਲਵੋ (ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਇਕ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਪਿੱਛੋਂ)।
- ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਈਸੋਨਾਯਾਜ਼ਿਡ ਤੇ ਪਿਰਿਡਾਕਸਿਨ (ਵਿਟਾਮਨ ਬੀ₆) ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲਵੋ।
- ਜੇ ਦੁਆਈ ਲੈਣੀ ਭੁੱਲ ਜਾਵੋਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਯਾਦ ਆਵੇ ਝਟਪਟ ਲੈ ਲਵੋ। ਪਰ ਜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਕ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਵਕਤ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਭੁੱਲੀ ਹੋਈ ਖੁਰਾਕ ਨਾ ਲਵੋ।
ਦੁਗਣੀ ਖੁਰਾਕ ਨਾ ਲਵੋ।

ਕੀ ਆਈਸੋਨਾਯਾਜ਼ਿਡ ਅਤੇ ਪਿਰਿਡਾਕਸਿਨ (ਵਿਟਾਮਨ ਬੀ₆) ਦੂਜੀਆਂ ਦੁਆਈਆਂ ਤੇ ਪਰਸਪਰ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ?

- ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪੀਓ।
- ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਹਦੇ ਦੇ ਦਰਦ ਜਾਂ ਜਲਣ ਲਈ ਐਂਟੀਐਸਿਡ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਈਸੋਨਾਯਾਜ਼ਿਡ ਨਾਲੋਂ ਦੋ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਨਾਲ ਲਓ।
- ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੁਆਈਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸ ਜਾਂ ਫ਼ਾਰਮਸਿਸਟ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੁਆਈਆਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ (ਨਾਨ-ਪ੍ਰੈਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ)।
- ਆਈਸੋਨਾਯਾਜ਼ਿਡ ਤੇ ਸੰਤਾਨ-ਸੰਜਮ ਦੀ ਗੋਲੀ (ਬਰਥ ਕੰਟਰੋਲ ਪਿਲ) ਦਾ ਇਕ ਦੂਜੀ ਤੇ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਫੇਰ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਤਾਨ ਸੰਜਮ ਦੀ ਇਕ ਗੋਲੀ ਵਿਚ ਏਬੀਨਲ ਇਸਟ੍ਰੋਡੀਅਲ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ $\leq 35 \mu\text{g}$ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਰਭ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ (ਜਿਵੇਂ ਨਿਰੋਧ ਆਦਿ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।

ਆਈਸੋਨਾਯਾਜ਼ਿਡ ਦੇ ਕੁਝ ਸੰਭਵ ਗੌਣ ਪ੍ਰਭਾਵ (ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ) ਕੀ ਹਨ?

- ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਆਈਸੋਨਾਯਾਜ਼ਿਡ ਦੇ ਕੋਈ ਗੌਣ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ।
- ਜੇ ਆਈਸੋਨਾਯਾਜ਼ਿਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਈਸੋਨਾਯਾਜ਼ਿਡ ਨੂੰ ਬ੍ਰੈਡ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕ੍ਰੈਕਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਟ ਠੀਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਈਸੋਨਾਯਾਜ਼ਿਡ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਤਪਦਿਕ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:

- ਚਮੜੀ ਉੱਤੇ ਖਾਰਸ਼ ਜਾਂ ਧੱਫੜ
- ਅਸਾਧਾਰਣ ਥਕਾਵਟ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ
- ਬੁਖਾਰ
- ਭੁੱਖ ਨਾ ਲਗਣੀ
- ਜੀ ਕੱਚਾ ਹੋਣਾ (ਉਲਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਉਤੇਜਨਾ)
- ਪੇਟ ਵਿਚ ਗੜਬੜ ਜਾਂ ਮਰੋੜ ਉਠਣੇ
- ਖ਼ਾਕੀ (ਚਾਹਰੰਗਾ) ਪਿਸ਼ਾਬ
- ਚਮੜੀ ਜਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਪੀਲਾ ਹੋਣਾ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਜਾਂ ਪੈਰ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਝਰਨਾਹਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਿਰਿਡਾਕਸਿਨ (ਵਿਟਾਮਨ ਬੀ₆) ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ।

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੁਆਈਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋਵੋਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੂਨ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੀ.ਬੀ. ਕਲਿਨਿਕ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਪੋਇਟਮੈਟ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੋ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ, ਜਾਂ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛਾਤੀਆਂ ਚੋਂ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵੋ।

ਮੈਂ ਆਈਸੋਨਾਯਾਜ਼ਿਡ ਤੇ ਪਿਰਿਡਾਕਸਿਨ (ਵਿਟਾਮਨ ਬੀ₆) ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲ ਕਰਾਂ?

- ਦੁਆਈ ਦੀਆਂ ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਕੱਸ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰੋ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ।
- ਠੰਢੀ ਤੇ ਸੁੱਕੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖੋ।
- ਚਾਨਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੋ।

ਬੀ.ਸੀ. ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ
ਟਬਰਕਲੋਸਿਸ ਕੰਟਰੋਲ
655 W 12th Ave
Vancouver BC V5Z 4R4

ਵੈਨਕੂਵਰ ਟੀ.ਬੀ. ਕਲਿਨਿਕ
ਟੈਲੀਫੋਨ: (604) 707-2692
ਫੈਕਸ: (604) 707-2690

ਨਿਊ ਵੈਸਟਮਿਨਸਟਰ ਟੀ.ਬੀ. ਕਲਿਨਿਕ
ਟੈਲੀਫੋਨ: (604) 707-2698
ਫੈਕਸ: (604) 707-2694

www.bccdc.ca

ਤਪਦਿਕ ਦਾ ਰੋਕਥਾਮ ਨਾਲ ਇਲਾਜ

ਆਈਸੋਨਾਯਾਜ਼ਿਡ
ਅਤੇ
ਪਿਰਿਡਾਕਸਿਨ (ਵਿਟਾਮਨ ਬੀ₆)
ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ



BC Centre for Disease Control
AN AGENCY OF THE PROVINCIAL HEALTH SERVICES AUTHORITY