

RIFAMPIN

Rifampin 是甚麼?

Rifampin 是一種抗生素用以預防和治療肺結核 (TB), 有時也會用於治療有關的感染。

應該何時服用此藥物?

- 在空肚時服食 (進食前 1 小時或進食後 2 小時服用)。
- 每日在相同的時間進食此藥。這會幫助你記得按時服食此藥。

應該怎樣服用此藥物?

- 最重要是持續不斷而且有規律地服用此藥。
- 按醫生的吩咐服用此藥。
- 你服用此藥物的方式是:
 - 每日一次, 每次兩粒。
 - 其他 _____

如果忘記服用, 應該如何處理?

- 在發覺時, 馬上補回忘記服用的藥物。但如果在發覺時已經臨近下次服用的時間, 則不須補回。
- 不要同時間服用雙重份量的藥物。

在服用此藥物時有何東西須要避免?

X 酒類飲料

如正在服用其他藥物 (包括不須處方的藥物), 一定要通知醫生或藥劑師。

如果你正在服用避孕藥, 請選用其他的避孕法 (例如: 避孕套)。

有何副作用會出現?

如果發現以下的徵狀, 請 **馬上停止服用此藥物** 並 **通知你的醫生或撥電 (604) 707-2692 通知【溫哥華肺結核控制中心】**。

- 不尋常的疲倦和虛弱
- 發燒
- 無胃口
- 噁心 (想嘔吐)
- 腸胃不適或腹瀉
- 小便色深
- 皮膚或眼睛變黃
- 口或舌赤痛
- 皮膚有瘀傷
- 出疹

最重要是遵照醫生的吩咐, 進行所有指定的實驗室檢驗。並須按照指定的日期與【溫哥華肺結核控制中心】會面。

此藥物會使你的眼淚, 唾液, 汗液 和大小便變成橙紅色, 這是無害的。不過會使你的隱形眼鏡永久變色。

如果你已經懷孕或計劃要懷孕, 或準備用人乳哺育嬰兒, 請通知醫生。

應該如何存放此藥物?

- 放在兒童拿不到的地方。
- 放在陰暗的地方。
- 膠囊劑: 貯藏在密封的容器內並存放於室溫、清涼和乾爽的地方。
- 水劑: 存放於室溫或雪櫃內。用前先搖勻

如有其他任何問題,
請致電【溫哥華肺結核控制中心】, 電話: (604) 707-2692