

# PYRAZINAMIDE

## Pyrazinamide 是甚麼?

Pyrazinamide 是一種抗生素, 只是用於治療肺結核 (TB).

## 應該何時服用此藥物?

- 每日在相同的時間進食此藥. 這會幫助你記得按時服食此藥.

## 應該怎樣服用此藥物?

- 最重要是持續不斷而且有規律地服用此藥.
- 按醫生的吩咐服用此藥.
- 你服用此藥物的方式是:
  - 每日一次, 每次三粒.
  - 其他 \_\_\_\_\_

## 如果忘記服用, 應該如何處理?

- 在發覺時, 馬上補回忘記服用的藥物. 但如果在發覺時已經臨近下次服用的時間, 則不須補回.
- 不要同時服用雙重份量的藥物.

## 在服用此藥物時有何東西須要避免?

- x** 酒類飲料

如正在服用其他藥物 (包括不須處方的藥物), 一定要通知醫生或藥劑師.

## 有何副作用會出現?

如果發現有以下的徵狀, 請馬上停止服用此藥物 並通知你的醫生或撥電 (604) 707-2692 通知【溫哥華肺結核控制中心】.

- 不尋常的疲倦和虛弱
- 發燒
- 無胃口
- 噁心 (想嘔吐)
- 腸胃不適或腹瀉
- 小便色深
- 皮膚或眼睛變黃
- 關節痛或腫脹
- 皮膚出疹或痕癢

最重要是遵照醫生的吩咐, 進行所有指定的實驗室檢驗. 並須按照指定的日期與【溫哥華肺結核控制中心】會面.

如果你已經懷孕或計劃要懷孕, 或是準備用人乳哺育嬰兒, 請通知醫生.

## 應該如何放置和收藏此藥物?

- 放在兒童拿不到的地方.
- 避免暴光, 貯藏在深色或不透光的容器內.
- 藥丸: 存放在室溫、清涼和乾爽的地方.
- 水劑: 存放在雪櫃內. 用前先搖勻.

如有其他任何問題,  
請致電【溫哥華肺結核控制中心】電話: (604) 707-2692