

# ETHAMBUTOL

## Ethambutol 是甚麼?

Ethambutol 是治療肺結核 (TB) 的一種抗生素, 有時也會用於治療有關的感染。

## 應該何時服用此藥物?

- 在空肚時服食 (進食前 1 小時或進食後 2 小時服用)。
- 每日在相同的時間進食此藥。這會幫助你記得按時服食此藥。

## 應該怎樣服用此藥物?

- 最重要是持續不斷而且有規律地服用此藥。
- 按醫生的吩咐服用此藥。
- 你服用此藥物的方式是:
  - 每日一次, 每次兩粒。
  - 其他 \_\_\_\_\_

## 如果忘記服用, 應該如何處理?

- 在發覺時, 馬上補回忘記服用的藥物。但如果在發覺時已經臨近下次服用的時間, 則不須補回。
- 不要同時服用雙重份量的藥物。

## 在服用此藥物時有何東西須要避免?

- X** 抗胃酸藥物  
服用抗胃酸藥物兩小時後才能進食此藥物。

如正在服用其他藥物 (包括不須處方的藥物), 一定要通知醫生或藥劑師。

## 有何副作用會出現?

如果發現以下的徵狀, 請馬上停止服用此藥物並通知你的醫生或撥電 (604) 707-2692 通知【溫哥華肺結核控制中心】。

- 視力改變或模糊不清。
- 不能分辨「紅」和「綠」兩種顏色。

最重要是遵照醫生的吩咐, 進行所有指定的實驗室檢驗和視力測試, 並須按照指定的日期與【溫哥華肺結核控制中心】會面。

如果你的視力發生問題或有痛風症或腎功能失調, 請立即通知醫生。

如果你已經懷孕或計劃要懷孕, 或是希望用人乳哺育嬰兒, 亦請通知醫生。

## 應該如何放置和收藏此藥物?

- 放在兒童拿不到的地方。
- 避免暴光, 貯藏在深色或不透光的容器內。
- 藥丸: 存放在室溫、清涼和乾爽的地方。
- 水劑: 存放在雪櫃內。用前先搖勻。

如有其他任何問題,  
請致電【溫哥華肺結核控制中心】, 電話: (604) 707-2692