



## 아목시실린 AMOXICILLIN

아목시실린은 특정 성 매개 감염(STI) 치료용으로 복용하는 항생제입니다.

### 알레르기(Allergies)

- 페니실린계 항생제(예: 아목시실린, 페니실린 V-K)나 세팔로스포린(cephalosporin)계 항생제(예: 세픽심(cefixime)(Suprax®), 세팔렉신(cephalexin)(Keflex®), 세파클로르(cefaclor)(Ceclor®))에 알레르기가 있으시면 의료 제공자에게 알려주십시오.

### 임신과 수유(Pregnancy and Chest/Breastfeeding)

- 아목시실린은 임신과 수유 기간에 복용하셔도 됩니다. 의료 제공자와 상담하시기 바랍니다.

### 주의 사항(CAUTION)

- 아목시실린 마지막 용량 투여와 경구 장티푸스 생백신(Vivotif®) 투여 사이에 24 시간 이상 간격을 두십시오.
- **약물 상호 작용:** 개개의 약물 상호 작용이 이 문서에 더는 기재되지 않음을 알려드립니다. 처방 약이나 비처방 약, 생약, 레크리에이션 제품을 복용 중이시면 의료 제공자와 상의하시기 바랍니다.

### 부작용(Side effects)

- 발진이나 두통, 설사, 메스꺼움, 구토가 있을 수 있습니다.
- 다음과 같은 알레르기 반응 징후가 있으면 즉시 응급 의료를 받으십시오:  
두드러기, 호흡 곤란, 얼굴과 입술, 혀, 목구멍의 부기.

## 아목시실린 AMOXICILLIN

### 복용 방법(Instructions for Taking)

- 이 약은 마칠 때까지 음식과 함께 또는 빈속에 복용하십시오. 의료 제공자가 지시하는 용량을 따르십시오.
- 복용을 1 회 잊으시면 기억나는 대로 바로 복용하십시오. 그러나 다음 용량을 복용할 시간이 거의 다 됐다면 놓친 용량을 건너뛰십시오. 두 배로 복용하지 마십시오.

### 보관 방법(Storage Instructions)

- 15°~30°C의 상온에 보관하십시오.
- 빛, 열, 습기로부터 보호하십시오.
- 표시된 유효 기간이 지난 약은 사용하지 마십시오.
- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 두십시오.

### 특별 주의 사항(Special Instructions)

- 다음 시점까지 성관계를 갖지 마십시오.
  - 본인이 치료를 완료했음. **또한**
  - 검사 결과가 음성이어도 성관계 파트너 역시 치료를 받았고 또한 성관계 파트너의 치료가 시작된 이후 1 주일이 경과함
- 치료를 받지 않은 파트너와 성관계를 하시는 경우 또는 본인이나 파트너의 치료가 완료되기 전에 성관계를 하시는 경우 재치료를 받으셔야 합니다. 의료 제공자와 상의하시기 바랍니다.
- **완치 여부 검사:** 의료 제공자가 클라미디아나 임질 치료용으로 아목시실린을 처방했다면 치료 완료 3~4 주 후에 다시 검사하여 감염 완치 여부를 확인하실 것을 권합니다.

궁금한 점이 있거나 정보가 더 필요하시면 <http://www.smartsexresource.com> 을 보시거나 의료 제공자에게 연락하시기 바랍니다.