

アジスロマイシン (AZITHROMYCIN)

アジスロマイシンは、特定の性感染症（STI）の治療のために経口で服用する抗生物質です。

アレルギー（Allergies）

- アジスロマイシン、エリスロマイシンまたはクラリスロマイシンなどにアレルギーがある場合は、ご自身の医療提供者にご相談ください。

妊娠と授乳（Pregnancy and Breast/Chest feeding）

- アジスロマイシンは、妊娠中および授乳中に慎重に注意して使用することができます。ご自身の医療提供者にご相談ください。

注意（CAUTION）

- アジスロマイシンは、アルミニウムおよび／またはマグネシウムを含む制酸剤と併用しないでください。少なくとも2時間の間隔をあけて服用してください。
- 肝臓、腎臓および／または心臓病の既往、不整脈または電解質異常（徐脈、QT 間隔延長、低カリウム血症、低マグネシウム血症など）がある場合は、ご自身の医療提供者に伝えてください。
- 薬物相互作用：個々の薬物の相互作用は、この文書には記載されなかったことにご注意ください。処方薬、非処方薬、ハーブ系薬剤、またはレクリエーション薬物を服用している場合は、医療提供者に相談してください。

副作用 (Side Effects)

- 下痢、吐き気、腹痛または嘔吐が起こることがあります。

服用上の注意（Instructions for Taking）

- アジスロマイシンは、食物と一緒にまたは別に服用してください。
- ご自身の医療提供者の処方指示に従ってください。

保管上の注意 (Storage Instructions)

- 15～30℃の室温で保存してください。
- 光、熱、湿度を避けてください。
- 記載された有効期限を過ぎたものは使用しないでください。
- 子供の手の届かないところに保管してください。

特別な指示 (Special Instructions)

- 以下の時期まで性行為を避けてください。
 - 治療開始から一週間、またはご自身の医療提供者の指示した期間が経過し、かつ、
 - あなたのパートナー（たち）も治療を受け、一週間が経過した時点まで。これはパートナー（たち）の検査結果が陰性であった場合も同様です。
- 未治療のパートナーと性行為を行った場合、または、あなたご自身またはパートナー（たち）が治療完了前に性行為を行った場合、あなたには再治療が必要になります。ご自身の医療提供者にご相談ください。

ご質問または詳しい情報をご希望の場合は、www.smartsexresource.com にアクセスするか、またはご自身の医療提供者にご連絡ください。