

DOXYCYCLINE

La doxycycline est un antibiotique administré par voie orale pour traiter certaines infections transmissibles sexuellement (ITS).

Allergies (Allergies)

- Informez votre fournisseur de soins de santé si vous êtes allergique à des antibiotiques de la famille des tétracyclines tels que la tétracycline ou la minocycline.

Grossesse et Allaitement (Pregnancy and Breast/Chest Feeding)

- La doxycycline n'est **pas** sans danger pendant la grossesse.
- La doxycycline doit être évitée pendant l'allaitement au sein ou au torse avec du lait exprimé en raison des effets inconnus sur la santé des nourrissons attribués à son exposition. Consultez votre fournisseur de soins de santé.

MISES EN GARDE (CAUTION)

- La doxycycline peut rendre votre peau plus sensible et vous pouvez attraper un coup de soleil et/ou ressentir des picotements, engourdissements ou des sensations inhabituelles dans les zones exposées. Évitez l'exposition excessive au soleil ou aux rayons UV artificiels (lampes solaires ou lits de bronzage). Utilisez un écran solaire et portez des vêtements de protection si vous êtes au soleil.
- Évitez les produits contenant du calcium, de l'aluminium et du magnésium (que l'on trouve fréquemment dans les compléments alimentaires et les antiacides) ni de sous-salicylates de bismuth (Pepto Bismol^{MD}) en même temps que la doxycycline. Prenez la doxycycline 2 heures avant ou 6 heures après la prise de ces produits.
- **La doxycycline peut aggraver les symptômes de la myasthénie grave.** Si vous avez une myasthénie grave (trouble neuromusculaire), veuillez consulter votre fournisseur de soins de santé avant de prendre la doxycycline.
- Informez votre fournisseur de soins de santé si vous avez des antécédents d'infection vaginale à levures.
- **Interactions médicamenteuses :** Veuillez noter que les interactions médicamenteuses spécifiques ne sont désormais plus mentionnées dans ce document. Si vous prenez des produits sur ordonnance, en vente libre, à base de plantes ou récréatifs, veuillez en discuter avec votre fournisseur de soins de santé.

Effets Secondaires (Side Effects)

- Vous pouvez avoir des diarrhées, des nausées, des douleurs abdominales soudaines et intenses, des vomissements, des maux de tête, des éruptions cutanées ou une photosensibilité (sensibilité accrue au soleil).

Instructions pour la Prise (Instructions for Taking)

- Prenez des médicaments avec de la nourriture pour éviter les maux d'estomac.
- Il ne faut pas écraser, mâcher ou ouvrir la capsule.
- Avalez le médicament en entier avec un grand verre d'eau, puis restez debout pendant au moins 30 minutes.
- Si vous oubliez une dose, prenez-la dès que vous vous en rendez compte. Toutefois, s'il est proche de votre prochaine dose, sautez la dose et reprenez le temps de prise habituel. Ne prenez pas une double dose.

Instructions de Conservation (Storage Instructions)

- Conservez ce médicament à la température ambiante entre 15 et 30 °C.
- Protégez-le de la lumière, de la chaleur et de l'humidité.
- N'utilisez pas ce médicament au-delà de la date de péremption imprimée.
- Ne le laissez pas à la portée des enfants.

Instructions Spéciales (Special Instructions)

- N'ayez plus de relations sexuelles :
 - jusqu'à ce qu'une semaine se soit écoulée depuis le début de votre traitement ou suivant les conseils de votre fournisseur de soins de santé; et
 - avec vos partenaires sexuels actuels jusqu'à ce qu'une semaine se soit écoulée depuis le début de leur traitement, même si les résultats de leurs tests sont négatifs.
- Vous devrez suivre un nouveau traitement si vous avez des relations sexuelles avec un partenaire qui n'a pas été traité ou si vous avez des rapports avant même que toutes les parties concernées aient terminées leurs traitements. Veuillez en parler avec votre fournisseur de soins de santé.

Si vous avez des questions ou avez besoin de plus d'informations, consultez www.smartsexresource.com ou contactez votre fournisseur de soins de santé.