



BC Centre for Disease Control
An agency of the Provincial Health Services Authority

655 West 12th Avenue
Vancouver, BC V5Z 4R4

Tel 604.707.2443
Fax 604.707.2441

www.bccdc.ca

Clinical Prevention Services –
STI Control:

604.707.5600
604.707.5604

www.SmartSexResource.com

메트로니다졸 Metronidazole

메트로니다졸은 세균 질증(bacterial vaginosis) 또는 특정 성 매개 감염(STI)(예: 트리코모나스증(trichomoniasis)) 치료용으로 복용하는 항생제입니다.

알레르기(Allergies)

- 메트로니다졸(Flagyl®)에 알레르기가 있으시면 의료 제공자에게 알려주십시오.

임신과 수유(Pregnancy and Chest/Breastfeeding)

- 메트로니다졸은 의료 제공자와 상의한 후에만 임신 1기(첫 3개월)에 사용하여도 되며, 임신 2기와 3기에 사용하여도 됩니다.
- 메트로니다졸은 처방 용량에 따라 수유 기간에 사용하여도 됩니다. 메트로니다졸 단일 용량 2g을 처방받으면 복용 후 12~24시간 동안 모유를 펌프로 짜낸 다음 버려서 약이 몸에서 빠져나가게 하십시오.

주의 사항(CAUTION)

- 간이나 혈액, 신경계 질환이 있으시면 의료 제공자에게 알려주십시오.
- 복용 12시간 전과 치료 중 및 복용 24~48시간 후에는 알코올을 마시거나 알코올 함유 약물(예: Nyquil®)을 복용하지 마야 역효과(홍조, 두통, 메스꺼움, 구토, 경련, 매우 빠르거나 고르지 않은 심장 박동, 실신 등)를 방지하십시오.
- 기존 심장 질환이나 부정맥이 있으시면 의료 제공자에게 알리시기 바랍니다.
- 메트로니다졸을 복용하시는 동안에는 다음 약을 복용하지 마십시오.
 - 부정맥 약: 드로네다론(dronedarone)(Multaq®)
 - 정신병 치료제: 피모자이드(pimozide)(Orap®), 지프라시돈(ziprasidone)(Zeldox®)
 - 알코올 중독 치료제: 디설피람(disulfiram)(Antabuse®)
 - HIV 약: 로피나비르/리토나비르(lopinavir/ritonavir)(Kaletra®) 경구 용액, 티프라나비르(tipranavir)(Aptivus®)

메트로니다졸 Metronidazole

- 기생충 치료제: 메벤다졸(mebendazole)(Vermox®)
- 경구 장티푸스 백신(Vivotif®)
- **약물 상호 작용:** 개개의 약물 상호 작용이 이 문서에 더는 기재되지 않음을 알려드립니다. 처방 약이나 비처방 약, 생약, 레크리에이션 제품을 복용 중이시면 의료 제공자와 상의하시기 바랍니다.

부작용(Side Effects)

- 설사, 메스꺼움, 복통, 구토, 소화 불량, 불쾌한 금속성 입맛, 짙은 소변 등의 부작용이 있을 수 있습니다.
- 신경계 질환(발작, 혼돈, 현기증, 두통, 힘 없음, 사지 마비나 통증, 일시적 시력 문제 등)이 나타나면 의료 제공자에게 즉시 연락하고 차량 운전이나 기계류 작동을 하지 마십시오.
- 알레르기 반응이나 피부 반응(예: 발진, 가려움)이 나타나면 의료 제공자에게 즉시 연락하십시오.

복용 방법(Instructions for Taking)

- 메트로니다졸을 음식과 함께 복용하시면 배앓이를 줄일 수 있습니다.
- 복용을 1 회 잊으시면 기억나는 대로 바로 복용하십시오. 그러나 다음 복용 시간이 가까우면 놓친 용량을 건너뛰고 평소 복용 시간을 다시 따르십시오. 두 배로 복용하지 마십시오.

보관 방법(Storage Instructions)

- 15°~30°C의 상온에 보관하십시오.
- 빛, 열, 습기로부터 보호하십시오.
- 표시된 유효 기간이 지난 약은 사용하지 마십시오.
- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 두십시오.

특별 주의 사항(Special Instructions)

세균 질증 치료:

- 여성 파트너가 있는 여성의 경우, 파트너가 세균 질증 검사를 받고 결과가 양성이면 치료받을 것을 권합니다.

트리코모나스증 치료:

- 다음 시점까지 성관계를 갖지 마십시오.
 - 1회 용량 치료 후 1주일 또는 7일 치료 완료 시점까지 및
 - 검사 결과가 음성이어도 성관계 파트너 역시 치료를 받았고 또한 성관계 파트너의 치료가 시작된 이후 1주일이 경과함
- 치료를 받지 않은 파트너와 성관계를 하시는 경우 또는 본인이나 파트너의 치료가 완료되기 전에 성관계를 하시는 경우 재치료를 받으셔야 합니다. 의료 제공자와 상의하시기 바랍니다.

궁금한 점이 있거나 정보가 더 필요하시면 www.smartsexresource.com 을 보시거나 의료 제공자에게 연락하시기 바랍니다.