



BC Centre for Disease Control
Provincial Health Services Authority

Provincial Tuberculosis Services

Main Switchboard
TB Services Fax

604 707 2692
604 707 2690

www.bccdc.ca

Spanish

LEVOFLOXACINA LEVOFLOXACIN

La levofloxacin es un antibi3tico que se utiliza para el tratamiento de infecciones bacterianas.

¿Cu3ndo debo tomarlo? (When should I take this?)

- La levofloxacin puede tomarse con o sin alimentos.
- T3mela con un vaso de agua lleno de 8 oz (240 ml).
- T3mela a la misma hora todos los d3as. Esto le ayudar3 a recordar tomar el medicamento.
- Tome varios vasos de l3quidos a lo largo del d3a.

¿C3mo debo tomarlo? (How should I take this?)

- Es muy importante que tome la levofloxacin exactamente como se lo indique su m3dico.

¿Qu3 debo hacer si se me olvida tomar una dosis? (What should I do if I miss a dose?)

- Si se le olvida tomar una dosis, t3mela tan pronto como lo recuerde. Pero si ya casi es hora de tomar la dosis del siguiente d3a, omita la dosis que olvid3.
- **No tome una dosis doble.**

¿Hay algo que deba evitar mientras lo tomo? (Is there anything I should avoid when taking this?)

- La levofloxacin debe tomarse por lo menos **2 horas antes o 2 horas despu3s** de tomar lo siguiente:
 - Anti3cidos que contengan aluminio, calcio o magnesio (p. ej., Maalox®, Mylanta®, Roloids®).
 - Sucralfato (medicamento para las 3lceras).
 - Complementos que contengan calcio, hierro o zinc.

Antes de tomar **LEVOFLOXACINA**, aseg3rese de informar a su m3dico, enfermera o farmac3uta todos los medicamentos (incluidos aquellos que no requieren de receta) que est3 tomando. **NO** empiece a tomar un nuevo medicamento sin consultar a un m3dico o a un farmac3uta

¿Cu3les son algunos de los posibles efectos secundarios? (What are some possible side effects?)

- n3usea, v3mito, diarrea
- dolor de cabeza
- mareo o aturdimiento
- insomnio

Last reviewed by BCCDC Pharmacy February 2022

Page 1 of 2

LEVOFLOXACINA LEVOFLOXACIN

Precaución (Caution): llame a su médico o enfermera de inmediato si presenta los siguientes síntomas:

- Sarpullido, urticaria o dificultad para respirar
- Ritmo cardíaco irregular o dolor en el tórax
- Dolor en los músculos, los tendones o las articulaciones
- Dolor, ardor, hormigueo, adormecimiento o debilidad en las manos o los pies
- Coloración amarilla en la piel o en la parte blanca de los ojos
- Cambios o alteraciones en la vista
- Diarrea intensa o con sangre
- Convulsiones
- Cualquier otro efecto secundario persistente

Informe a su médico si presenta algún síntoma inusual que no se haya mencionado en esta hoja informativa.

La levofloxacina puede causar aturdimiento o mareo. Tenga cuidado al manejar, operar maquinaria, llevar a cabo actividades peligrosas o realizar algún trabajo que requiera claridad mental o coordinación.

La levofloxacina puede hacer que la piel se queme fácilmente con el sol. Evite la exposición excesiva a la luz solar o a la luz ultravioleta artificial (p. ej., camas de bronceado, lámparas solares). Use un filtro de protección solar o use ropa protectora.

Si tiene diabetes, hágase con regularidad análisis de los niveles de glucosa sanguínea mientras tome este medicamento.

Informe a su médico si está embarazada, si planea quedar embarazada o si desea amamantar a su bebé.

¿Dónde debo almacenar este medicamento? (Where should I store this medication?)

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Comprimidos: almacenar a temperatura ambiente (de 15 °C a 30 °C) en un recipiente bien cerrado.
- Mantener lejos del calor y de la luz directa. Almacenar en un lugar fresco y seco.

¿A dónde llamo si tengo alguna otra pregunta? (Where do I call if I have any other questions?)

A su médico, clínica o unidad de salud pública: _____
Clínica de servicios para la TB en Vancouver: 604-707-2692
Clínica de servicios para la TB en New Westminster: 604-707-2698
Servicio de farmacia y vacunas del Centro de Control de Enfermedades de la Colombia Británica (BCCDC): 604-707-2580