



Spanish

## ÁCIDO PARAAMINOSALICÍLICO para-AMINOSALICYLIC ACID

El ácido paraaminosalicílico (PASER®) es un agente antibacteriano que se utiliza para el tratamiento de la tuberculosis.

### ¿Cuándo debo tomarlo? (When should I take this?)

- Tómelo con alimentos para reducir el malestar estomacal.
- Tome este medicamento a la misma hora todos los días. Esto le ayudará a recordar tomarlo.

### ¿Cómo debo tomarlo? (How should I take this?)

- Es muy importante que tome este medicamento con regularidad como se lo indique su médico.
- Abra el paquete cuando esté listo/a para tomar su dosis. Espolvoree todos los gránulos sobre alimentos ácidos, como puré de manzana o yogur, y tráguese los gránulos enteros sin masticarlos, o bien, **CON UN MOVIMIENTO CIRCULAR** mézclelos en una bebida de frutas, como jugo de tomate, jugo de naranja, jugo de uva, jugo de arándano, jugo de manzana o ponche de frutas.
- **No los utilice si el paquete está inflado o si los gránulos han perdido su color tostado y están de color café oscuro o morado.**
- Es posible que vea gránulos vacíos en las heces; esto es normal.

### ¿Qué debo hacer si se me olvida tomar una dosis? (What should I do if I miss a dose?)

- Si se le olvida tomar una dosis, tómela tan pronto como lo recuerde. Pero si ya casi es hora de tomar la dosis del siguiente día, omita la dosis que olvidó.
- **No tome una dosis doble.**

### ¿Hay algo que deba evitar mientras lo tomo? (Is there anything I should avoid when taking this?)

- Antes de tomar **PASER**, asegúrese de informar a su médico, enfermera o farmacéuta todos los medicamentos (incluidos aquellos que no requieren de receta) que está tomando. **NO** empiece a tomar un nuevo medicamento sin consultar a un médico o a un farmacéuta.

### ¿Cuáles son algunos de los posibles efectos secundarios? (What are some possible side effects?)

- Náusea y vómito
- Diarrea
- Dolor estomacal

## ÁCIDO PARAAMINOSALICÍLICO para-AMINOSALICYLIC ACID

**Precaución (Caution): llame a su médico o enfermera de inmediato si presenta los siguientes síntomas:**

- Sarpullido
- Fiebre
- Náusea o vómito persistentes
- Pérdida del apetito
- Coloración amarilla en la piel o en la parte blanca de los ojos
- Cansancio o debilidad inusuales
- Orina oscura, de color rosado o con sangre
- Heces negras
- Cualquier otro efecto secundario persistente

**Informe a su médico si presenta algún síntoma inusual que no se haya mencionado en esta hoja informativa.**

Es posible que necesite inyecciones de vitamina B12 si toma PASER durante más de un mes. Consulte a su médico si siente debilidad o cansancio.

PASER podría interferir con algunas **pruebas de cetonas** en orina.

Informe a su médico si está embarazada, si planea quedar embarazada o si desea amamantar a su bebé.

**¿Dónde debo almacenar este medicamento? (Where should I store this medication?)**

- Mantener los paquetes cerrados hasta que esté listo/a para usarlos.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Almacenar en el **refrigerador** o en el **congelador** (a menos de 15 °C).
- Evitar el almacenaje en un lugar de calor excesivo.
- Mantener lejos de la luz directa.

**¿A dónde llamo si tengo alguna otra pregunta? (Where do I call if I have any other questions?)**

A su médico, clínica o unidad de salud pública: \_\_\_\_\_

Clínica de servicios para la TB en Vancouver:	604-707-2692
Clínica de servicios para la TB en New Westminster:	604-707-2698
Servicio de farmacia y vacunas del Centro de Control de Enfermedades de la Colombia Británica (BCCDC):	604-707-2580