BC Centre for Disease Control
Provincial Health Services Authority

STI/HIV Services 604.707.5600
Clinical Prevention Services 604.707.5604
655 West 12th Avenue bccdc.ca
Vancouver, BC V5Z 4R4 smartsexresource.com

PRISTINAMYCINE (PRISTINAMYCIN)

La pristinamycine (Pyostacine[MD]) est un antibiotique administré par voie orale pour traiter des infections transmissibles sexuellement (ITS) quand d'autres traitement ne peuvent pas être utilisés. La pristinamycine n'est seulement disponible que par autorisation spéciale de Santé Canada et cette demande doit être faite par votre fournisseur de soins de santé.

Allergies (Allergies)

- Si vous avez des antécédents d'allergie aux antibiotiques ou une allergie aux aliments suivants :
  - Blé* – évitez d'utiliser la pristinamycine
  - Gélatine

    ** La pristinamycine contient des traces d'amidon de blé (contient du gluten) mais peut être utilisée par les patients atteints de maladie céliaque*

Grossesse et allaitement (Pregnancy and Breast/Chest feeding)

Veuillez informer votre fournisseur de soins de santé si vous êtes enceinte. Évitez d'utiliser ce produit si vous allaitez au sein ou au torse avec du lait exprimé.

MISES EN GARDE (CAUTION)

- Si vous avez des troubles sanguins, une maladie des reins, une maladie du foie ou des troubles psychiatriques, veuillez informer votre fournisseur de soins de santé.
- Avisez votre fournisseur de soins de santé si vous prenez de la colchicine (un médicament couramment utilisé comme traitement pour la goutte), des antagonistes de la vitamine K et/ou des immunosuppresseurs.
- Consultez votre fournisseur de soins de santé si vous avez reçu récemment ou prévoyez recevoir les vaccins suivants :
  - Vaccin contre la tuberculose BCG – par voie intravésicale
  - Vaccin contre le choléra (Vaxchora[MD])
  - Vaccin oral contre la typhoïde (Vivotif[MD])
- Interactions médicamenteuses : Veuillez noter que les interactions médicamenteuses spécifiques ne sont désormais plus mentionnées dans ce document. Si vous prenez des produits sur ordonnance, en

Last review by BCCDC Pharmacy: May 2025

vente libre, à base de plantes ou récréatifs, veuillez en discuter avec votre fournisseur de soins de santé.

Effets secondaires (Side Effects)

- Vous pouvez avoir des nausées, des vomissements, de la diarrhée, des maux d'estomac, une sensation de plénitude ou de lourdeur ou une éruption cutanée.
- Si vous avez des réactions cutanées ou des réactions qui s'aggravent (p. ex. de l'urticaire, une éruption cutanée, des démangeaisons, etc.) ou de la diarrhée douloureuse, aqueuse ou sanglante, arrêtez le traitement et veuillez le signaler à votre fournisseur de soins de santé.

Instructions pour la prise (Instructions for Taking)

- Prenez deux comprimés de pristinamycine de 500 mg (= 1000 mg) trois fois par jour pendant 10 jours avec de la nourriture et un verre d'eau plein. Prenez vos comprimés jusqu'à la fin du traitement avec tout autre médicament prescrit pour cette affection, tel que recommandé.
- Si vous oubliez de prendre une dose, prenez-la dès que possible, toutefois, si le temps est presque venu de prendre votre prochaine dose, prenez seulement cette dose. Ne doublez pas la dose.

Instructions de conservation (Storage Instructions)

- Conservez ce médicament à la température ambiante entre 15 et 30 °C.
- N'utilisez pas ce médicament au-delà de la date de péremption imprimée.
- Ne le laissez pas à la portée des enfants.
- Conserver les comprimés dans la plaquette alvéolée d'origine jusqu'à leur prise.

Instructions spéciales (Special Instructions)

- N'ayez plus de relations sexuelles :
    - jusqu'à ce qu'une semaine se soit écoulée depuis le début de votre traitement ou suivant les conseils de votre fournisseur de soins de santé; et
    - tant que vos partenaires sexuels n'ont pas également été traités et qu'une semaine s'est écoulée depuis le début de leur traitement, même si les résultats de leurs tests sont négatifs.
- Vous devrez suivre un nouveau traitement si vous avez des relations sexuelles avec un partenaire qui n'a pas été traité ou si vous avez des rapports avant même que toutes les parties concernées aient terminées leurs traitements. Veuillez en discuter avec votre fournisseur de soins de santé.

Si vous avez des questions ou avez besoin de plus d'informations, consultez www.smartsexresource.com ou contactez votre fournisseur de soins de santé.