

프리스티나마이신(PRISTINAMYCIN)

프리스티나마이신(Pyostacine®)은 다른 치료법을 사용할 수 없을 때 성 매개 감염(STI) 치료용으로 복용하는 항생제입니다. 프리스티나마이신은 캐나다 보건부의 특별 허가를 받아야만 구할 수 있으며, 의료 제공자가 허가를 반드시 요청하여야 합니다.

알레르기(Allergies)

- 항생제 알레르기 병력이 있거나 다음 중 어느 하나에든 알레르기가 있으시면 의료 제공자에게 알려주십시오.
 - 밀* – 프리스티나마이신 사용을 삼가하십시오.
 - 젤라틴

** 프리스티나마이신에는 미량의 밀 전분(글루텐 함유)이 들어 있지만, 복강병(celiac disease) 환자에게 사용할 수 있습니다.*

임신과 젖먹이기(Pregnancy and Breast/Chest Feeding)

임신하셨다면 의료 제공자에게 알려주십시오. 젖을 먹이는 중에는 제품을 사용하지 마십시오.

주의 사항(CAUTION)

- 혈액이나 콩팥, 간, 정신 질환이 있으시면 의료 제공자에게 알려주십시오.
- 콜히친(colchicine, 통풍 치료에 일반적으로 사용되는 약), 비타민 K 길항제 및/또는 면역 억제제를 복용 중이시면 의료 제공자에게 알려주십시오.
- 최근에 다음 백신 접종을 받았거나 받을 계획이 있으시면 의료 제공자에게 알려주십시오.
 - BCG 백신 – 방광 내 투여
 - 콜레라 백신(Vaxchora®)
 - 경구 장티푸스 백신(Vivotif®)
- 약물 상호 작용: 개개의 약물 상호 작용이 이 문서에 더는 기재되지 않음을 알려드립니다. 처방 약이나 비처방 약, 생약, 레크리에이션 제품을 복용 중이시면 의료 제공자와 상의하시기 바랍니다.

부작용(Side Effects)

- 메스꺼움이나 구토, 설사, 복부의 불편감이나 팽만감 또는 무거움, 발진이 있을 수 있습니다.
- 피부 반응(예: 두드러기, 발진, 가려움, 뾰루지 등)이 생기거나 악화하거나, 열이 있든 없든 통증이 있는 설사나 물변, 피 섞인 설사를 하시면 약 복용을 중단하고 의료 제공자에게 알려주십시오.

복용 방법(Instructions for Taking)

- 프리스티나마이신 500mg 정제 2 정(= 1000mg)을 10 일간 하루 3 회, 음식과 함께 물 한 잔을 다 마셔 복용하십시오. 끝까지 복용하시고 이 질환에 처방된 다른 약들과 함께 지시대로 복용하십시오.
- 복용을 1 회 잊으면 가능한 한 빨리 복용하시되 다음 용량 복용 시간이 가까우면 다음 용량만 복용하십시오. 용량을 두 배로 복용하지 마십시오.

보관 방법(Storage Instructions)

- 15~30°C 의 실온에 보관하십시오.
- 표시된 유효 기간이 지난 약은 사용하지 마십시오.
- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 두십시오.
- 정제는 복용 전까지 원래의 은박 포장 상태로 보관하십시오.

특별 주의 사항(Special Instructions)

- 다음 시점까지 성관계를 갖지 마십시오.
 - 치료 시작 후 1 주일 또는 의료 제공자가 권고한 기간 및
 - 검사 결과가 음성이어도 성관계 파트너 역시 치료를 받았고 또한 성관계 파트너의 치료가 시작된 이후 1 주일이 경과함
- 치료를 받지 않은 파트너와 성관계를 하시는 경우 또는 본인이나 파트너의 치료가 완료되기 전에 성관계를 하시는 경우 재치료를 받으셔야 합니다. 의료 제공자와 상의하시기 바랍니다.

궁금한 점이 있거나 정보가 더 필요하시면 <http://www.smartsexresource.com> 을 보시거나 의료 제공자에게 연락하시기 바랍니다.