

普里司他霉素 (PRISTINAMYCIN)

普里司他霉素 (Pyostacine®) 是一种口服抗生素，用于在其他治疗方案无法使用时治疗性传播感染 (STI)。普里司他霉素仅可通过加拿大卫生部的特别许可获得，必须由医务人员提出申请。

过敏 (Allergies)

- 如果您有抗生素过敏史或对以下任何物质过敏，请告知医务人员：
 - 小麦* - 小麦过敏者应避免使用普里司他霉素
 - 明胶
- *普里司他霉素含有微量小麦淀粉（含麸质），但可用于乳糜泻患者*

怀孕/哺乳 (Pregnancy and Breast/Chest Feeding)

如果您怀孕了，请告知医务人员。如果您正在哺乳，应避免使用本品。

警告 (CAUTION)

- 如果您有任何血液、肾脏、肝脏或精神疾病，请告知医务人员。
- 如果您正在服用秋水仙碱（一种常用于治疗痛风的药物）、维生素 K 拮抗剂和/或免疫抑制药物，请告知医务人员。
- 如果您近期曾接种过，或计划要接种以下疫苗，也请告知医务人员：
 - 卡介苗 - 膀胱内注射
 - 霍乱疫苗 (Vaxchora®)
 - 口服伤寒疫苗 (Vivotif®)
- 药物相互作用：请注意，本文件不再列出个别药物的相互作用。如果您在服用任何处方药、非处方药、草药或消遣性药物产品，请与医务人员讨论。

副作用 (Side Effects)

- 您可能会出现恶心、呕吐、腹泻、胃部不适、饱胀感或沉重感，或出现皮疹。
- 如果您出现皮肤反应或反应加重（如荨麻疹、皮疹、瘙痒、皮肤起疹等），或出现伴有或不伴有发热的疼痛性水样或血样腹泻，立即停药并通知医务人员。

服药说明 (Instructions for Taking)

- 每日三次，每次服用两片 500 毫克（相当于 1000 毫克）普里司他霉素片，连续服 10 天，随食物和整杯水一同服用。按医嘱与其他治疗该疾病的处方药一起服用，服完为止。
- 如果漏服一剂，应尽快补服；如果已接近下一次服药时间，则仅服用下一剂。不要服双倍剂量。

贮存说明 (Storage Instructions)

- 贮存于 15-30°C 室温下。
- 药物超出标示的失效日期，切勿使用。
- 谨防儿童接触。
- 将药片保存在原来的泡罩包装中，待用时取出

特殊说明 (Special Instructions)

- 在满足下列条件之前，不要进行性生活：
 - 您的治疗开始后已满一周，或根据医嘱，并且
 - 您的性伴侣也已接受治疗，而且自治疗开始后已满一周，即使他们的检测结果为阴性亦需治疗。
- 如果您与未经治疗的伴侣发生性关系，或是在您或伴侣的治疗完成之前发生性行为，则需重新治疗。请与医务人员讨论。

如果您有疑问或需要更多信息，请访问 <http://www.smartsexresource.com> 或联系医务人员。