

PRISTINAMICINA (PRISTINAMYCIN)

La pristinamicina (Pyostacine®) es un antibiótico que se toma por vía oral para el tratamiento de infecciones de transmisión sexual (ITS) cuando no pueden usarse otros tratamientos. La pristinamicina únicamente está disponible mediante un permiso especial de Health Canada, el cual deberá solicitar su proveedor de atención médica.

Alergias (Allergies)

- Informe a su proveedor de atención médica si tiene antecedentes de alergias a antibióticos o si tiene alergia a cualquiera de las siguientes cosas:
 - Trigo* – evite el consumo de pristinamicina
 - Gelatina

**La pristinamicina contiene cantidades mínimas de almidón de trigo (contiene gluten), pero puede usarse en pacientes con celiaquía*

Embarazo y lactancia (Pregnancy and Breast/Chest Feeding)

Informe a su proveedor de atención médica si está embarazada. Evite usar este producto si está amamantando.

ADVERTENCIA (CAUTION)

- Informe a su proveedor de atención médica si tiene alguna afección de la sangre, o alguna afección hepática, renal o psiquiátrica.
- Informe a su proveedor de atención médica si está tomando colchicina (un medicamento que se usa comúnmente como terapia para la gota), antagonistas de la vitamina K o medicamentos inmunosupresores.
- Informe a su proveedor de atención médica si ha recibido recientemente o si planea recibir las siguientes vacunas:
 - Vacuna BCG – intravesical
 - Vacuna contra el cólera (Vaxchora®)
 - Vacuna oral contra la fiebre tifoidea (Vivotif®)
- Interacciones medicamentosas: tenga en cuenta que este documento ya no incluye las interacciones medicamentosas individuales. Hable con su proveedor de atención médica si toma algún producto recetado, de venta libre, a base de hierbas o recreativo.

Efectos secundarios (Side Effects)

- Podría presentar náusea, vómito, diarrea, molestia estomacal, sensación de saciedad o pesadez, o sarpullido
- Si sus reacciones empeoran o si presenta reacciones cutáneas (es decir, urticaria, sarpullido, comezón, erupciones, etc.), o diarrea dolorosa, aguada o con sangre, acompañada o no de fiebre, suspenda el medicamento e informe a su proveedor de atención médica.

Instrucciones para su uso (Instructions for Taking)

- Tome dos comprimidos de pristinamicina de 500 mg (= 1000 mg) tres veces al día durante 10 días con alimento y un vaso completo de agua. Tómese los hasta que se los termine y en conjunto con otros medicamentos recetados para esta afección, según las indicaciones.
- Si omite una dosis, tómese la lo antes posible, pero si ya casi le toca tomar su siguiente dosis, tome solamente la siguiente dosis. No se tome una dosis doble.

Instrucciones de almacenamiento (Storage Instructions)

- Almacenar a temperatura ambiente entre 15 y 30 °C.
- No consumir los medicamentos después de la fecha de caducidad impresa.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Mantener los comprimidos en el paquete blíster original hasta que ya vayan a usarse.

Instrucciones especiales (Special Instructions)

- No tenga relaciones sexuales:
 - Hasta una semana después de haber iniciado su tratamiento, o hasta que se lo indique su proveedor de atención médica, Y
 - Hasta que su(s) pareja(s) sexual(es) también haya(n) recibido tratamiento, y que haya pasado una semana desde el inicio de su tratamiento, aunque los resultados de su prueba sean negativos.
- Tendrá que volver a recibir tratamiento si tiene relaciones sexuales con una pareja que no ha recibido tratamiento, o si tiene relaciones sexuales antes de que el periodo de tratamiento suyo o de su(s) pareja(s) haya terminado. Consulte a su proveedor de atención médica.

Si tiene alguna pregunta o si necesita información adicional, visite <http://www.smartsexresource.com> o comuníquese con su proveedor de atención médica.