

PRISTINAMYCIN

Pristinamycin (Pyostacine®) là một loại thuốc trụ sinh (kháng sinh) uống để điều trị một bệnh truyền nhiễm qua đường tình dục (STI) khi không thể dùng những cách điều trị khác. Chuyên viên chăm sóc sức khỏe phải xin phép đặc biệt qua Bộ Y Tế Canada (Health Canada) mới có thể dùng pristinamycin.

Dị Ứng (Allergies)

- Hãy cho chuyên viên chăm sóc sức khỏe biết nếu quý vị bị dị ứng với bất cứ thuốc trụ sinh (kháng sinh) nào hoặc bị dị ứng với bất cứ loại nào sau đây:
 - Lúa mì* – tránh dùng pristinamycin
 - Gelatin

**Pristinamycin có dính chút dấu vết bột tàn mì (có chứa gluten) nhưng có thể được dùng ở bệnh nhân bị bệnh celiac*

Thai Nghén và Cho Con Bú/Nuôi Con Bằng Sữa Mẹ (Pregnancy and Breast/Chest feeding)

Hãy cho chuyên viên chăm sóc sức khỏe biết nếu quý vị đang có thai. Tránh dùng sản phẩm này nếu đang cho con bú/nuôi con bằng sữa mẹ.

KHUYẾN CÁO (CAUTION)

- Hãy cho chuyên viên chăm sóc sức khỏe biết nếu quý vị bị bất cứ bệnh nào về máu, thận, gan, hoặc tâm thần.
- Hãy cho chuyên viên chăm sóc sức khỏe biết nếu quý vị đang dùng colchicine (một loại thuốc thường được sử dụng để điều trị bệnh gút (gout), thuốc kháng vitamin K, và/hoặc các loại thuốc ức chế miễn nhiễm.
- Thông báo cho chuyên viên chăm sóc sức khỏe nếu dạo gần đây quý vị mới hoặc đang định dùng những loại thuốc ngừa sau đây:
 - Thuốc ngừa BCG – trong bàng quang
 - Thuốc ngừa bệnh tả (Vaxchora®)
 - Thuốc uống ngừa bệnh thương hàn (Vivotif®)

- Phản Ứng Giữa Các Loại Thuốc: Xin lưu ý là tài liệu này không còn liệt kê từng trường hợp phản ứng giữa các loại thuốc. Nếu quý vị đang dùng bất cứ thuốc theo toa, thuốc không cần toa, thảo dược, hoặc các sản phẩm giải trí nào, xin thảo luận với chuyên viên chăm sóc sức khỏe.

Tác Dụng Phụ (Side Effects)

- Quý vị có thể bị buồn nôn, ói mửa, tiêu chảy, đau bụng, đầy hoặc nặng bụng, hoặc da nổi đỏ
- Nếu quý vị bị phản ứng da, hoặc trở nặng hơn (tức là nổi mề đay, da nổi đỏ, ngứa ngáy, nổi mẩn, v.v.) hoặc tiêu chảy làm đau đốn, chảy nước hoặc máu cùng với sốt/không sốt, hãy ngưng dùng thuốc và thông báo cho chuyên viên chăm sóc sức khỏe

Hướng Dẫn Dùng Thuốc (Instructions for Taking)

- Dùng hai viên thuốc pristinamycin 500 mg (= 1000 mg) mỗi ngày ba lần trong 10 ngày với thức ăn và một ly nước đầy. Uống cho đến khi hết thuốc và cùng với những loại thuốc khác được kê toa cho bệnh này theo đúng chỉ thị.
- Nếu quý vị quên dùng một liều, hãy dùng ngay càng sớm càng tốt hoặc nếu gần đến giờ dùng liều kế, chỉ dùng liều kế. Đừng uống liều gấp đôi.

Hướng Dẫn Lưu Trữ (Storage Instructions)

- Cất thuốc ở nhiệt độ trong phòng từ 15 đến 30°C.
- Đừng dùng thuốc quá ngày hết hạn ghi trên nhãn.
- Cất xa tầm với của trẻ em.
- Cất thuốc trong vỉ thuốc gốc cho đến khi sẵn sàng sử dụng

Hướng Dẫn Đặc Biệt (Special Instructions)

- Đừng làm tình cho đến:
 - Một tuần sau khi đã hoàn tất việc điều trị của quý vị; hoặc theo lời dặn của chuyên viên chăm sóc sức khỏe, VÀ
 - (Các) bạn tình của quý vị cũng đã được điều trị, và đã qua một tuần kể từ ngày họ bắt đầu được điều trị, ngay cả khi kết quả thử nghiệm của họ là âm tính.
- Quý vị sẽ cần phải điều trị lại nếu quý vị làm tình với một bạn tình chưa được điều trị, hoặc nếu quý vị làm tình trước khi quý vị hoặc (các) bạn tình của mình điều trị xong. Xin hỏi chuyên viên chăm sóc sức khỏe.

Nếu quý vị có bất cứ thắc mắc nào hay cần thêm chi tiết, xin đến <http://www.smartsexresource.com> hoặc liên lạc với chuyên viên chăm sóc sức khỏe.