

포스포마이신(FOSFOMYCIN)

포스포마이신은 방광 감염을 포함한 단순 요로 감염(UTI) 치료용으로 복용하는 항생제입니다.

알레르기(Allergies)

- 포스포마이신 트로메타민(fosfomycin tromethamine)이나 그 제형 성분(향료와 아황산염 포함)에 알레르거나 감수성이 있으시면 의료 제공자에게 알려주십시오.

임신과 젖먹이기(Pregnancy and Breast/Chest Feeding)

- 임신 계획이 있으시면 의료 제공자에게 알려주십시오.
- 포스포마이신은 임신과 젖먹이기 기간에 주의하여 사용하셔도 됩니다. 의료 제공자와 상담하시기 바랍니다

주의 사항(CAUTION)

- 간 및/또는 콩팥에 병이 있으시면 의료 제공자에게 알려주십시오.
- 약물 상호 작용:** 개개의 약물 상호 작용이 이 문서에 더는 기재되지 않음을 알려드립니다. 처방 약이나 비처방 약, 생약, 레크리에이션 제품을 복용 중이거나 최근에 생백신을 맞으셨다면 의료 제공자와 상의하시기 바랍니다.

부작용(Side Effects)

- 다음 부작용이 있을 수 있습니다.
 - 설사, 복통, 소화 불량, 메스꺼움, 구토
 - 발진과 가려움
 - 두통과 현기증
 - 콧물
 - 요통
- 설사는 복용 후 2 개월 이상 지나도 있을 수 있습니다. 설사가 계속되거나 더 심해지면 의료 제공자에게 알려주십시오.

복용 방법(Instructions for Taking)

- 의료 제공자가 지시하는 용량을 따르십시오.
- 포스포마이신은 공복에 또는 식후 최소 2~3 시간 후에 복용하십시오.
- 포스포마이신 한 봉지의 가루를 찬물 125mL(1/2 컵)에 모두 넣어 준비하십시오. 잘 섞어 녹인 다음 즉시 복용하십시오.
- 마른 가루를 직접 복용하지 마시고 뜨거운 물에 섞지 마십시오.

보관 방법(Storage Instructions)

- 15~30°C 의 실온에서 보관하십시오. 빛, 열, 습기로부터 보호하십시오.
- 용량을 복용할 때까지 봉지를 열지 마십시오.
- 표시된 유효 기간이 지난 약은 사용하지 마십시오.
- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 두십시오.

특별 주의 사항(Special Instructions)

- 증상이 3 일 안에 나아지지 않거나 악화하면 의료 제공자에게 연락하십시오.

궁금한 점이 있거나 정보가 더 필요하시면 <http://www.smartsexresource.com> 을 보시거나 의료 제공자에게 연락하시기 바랍니다.