



BC Centre for Disease Control
Provincial Health Services Authority

Clinical Prevention Services
Provincial STI/HIV Clinic

655, 12^e avenue ouest
Vancouver, C.-B. V5Z 4R4

Tél : 604-707-5600
Télééc. : 604-707-5604

www.bccdc.ca
www.SmartSexResource.com

Azithromycine Azithromycin

L'azithromycine est un antibiotique administré par voie orale pour traiter certaines infections transmissibles sexuellement (ITS).

Allergies (Allergies)

- Veuillez informer votre prestataire de soins de santé si vous avez une allergie aux **antibiotiques de type macrolide** comme : l'azithromycine (Z-pak^{MD}, Zithromax^{MD}), l'érythromycine ou la clarithromycine (Biaxin^{MD}).

Grossesse et allaitement (Pregnancy and Chest/Breastfeeding)

- L'azithromycine doit être utilisée avec prudence au cours de la grossesse et de l'allaitement. Veuillez consulter votre fournisseur de soins de santé.

MISES EN GARDE (CAUTION)

- **Interactions médicamenteuses** : Informez votre fournisseur de soins de santé si vous prenez des produits sur ordonnance, en vente libre, à base de plantes ou récréatifs. Toutes les interactions médicamenteuses individuelles ne sont pas répertoriées dans ce document.
- **Ne prenez pas d'antiacides à base d'aluminium ou de magnésium** en même temps que l'azithromycine. Attendez une à deux heures entre les prises.
- **Veillez informer votre fournisseur de soins de santé si vous avez des antécédents de maladie cardiaque, d'arythmie ou de perturbation de l'équilibre électrolytique**, p. ex. la bradycardie, l'allongement de l'intervalle QT, l'hypokaliémie et l'hypomagnésémie.
- **Les médicaments suivants ne doivent pas être pris en conjonction avec l'azithromycine** :
 - **Antipsychotique** : pimozide (Orap^{MD}), ziprasidone (Zeldox^{MD})
 - **Antiarythmique** : dronédarone (Multaq^{MD})
 - **Traitement contre les migraines** : dihydroergotamine (Migranal^{MD}), ergotamine (Cafergot^{MD})

Effets secondaires (Side Effects)

- Vous pouvez avoir des diarrhées, des nausées, des douleurs abdominales ou des vomissements.

Azithromycine (suite) Azithromycin (cont'd)

Instructions pour la prise (Instructions for Taking)

- L'azithromycine peut être prise avec ou sans nourriture.
- Suivez la posologie recommandée par votre fournisseur de soins de santé.

Instructions de conservation (Storage Instructions)

- Conservez ce médicament à la température ambiante entre 15 et 30 °C.
- Protégez-le de la lumière, de la chaleur et de l'humidité.
- N'utilisez pas ce médicament au-delà de la date de péremption imprimée.
- Ne le laissez pas à la portée des enfants.

Instructions spéciales (Special Instructions)

- N'ayez plus de relations sexuelles :
 - pendant une semaine après avoir terminé votre traitement ou suivant les conseils de votre fournisseur de soins de santé; **et**
 - tant que vos partenaires sexuels n'ont pas également été traités **et** qu'une semaine s'est écoulée depuis le début de leur traitement, même si les résultats de leurs tests sont négatifs.
- Vous devrez suivre un nouveau traitement si vous avez des relations sexuelles avec un partenaire qui n'a pas été traité ou si vous avez des rapports avant même que toutes les parties concernées aient terminées leurs traitements. Veuillez en discuter avec votre fournisseur de soins de santé.

Si vous avez des questions ou avez besoin de plus d'informations, consultez www.smartsexresource.com ou contactez votre fournisseur de soins de santé.