



BC Centre for Disease Control
Provincial Health Services Authority

Clinical Prevention Services
Provincial STI/HIV Clinic

655 West 12th Avenue
Vancouver, BC V5Z 4R4

Tel 604.707.5600
Fax 604.707.5604

www.bccdc.ca
www.SmartSexResource.com

アジスロマイシン Azithromycin

アジスロマイシンは、特定の性感染症（STI）の治療のために経口で服用する抗生物質です。

アレルギー（Allergies）

- アジスロマイシン（Z-pak[®]、Zithromax[®]）、エリスロマイシンまたはクラリスロマイシン（Biaxin[®]）などのマクロライド系抗生物質にアレルギーがある場合は、ご自身の医療提供者に相談してください。

妊娠と授乳（Pregnancy and Breastfeeding）

- アジスロマイシンは、妊娠中および授乳中に慎重に注意して使用することができます。ご自身の医療提供者に相談してください。

注意（CAUTION）

- **薬物相互作用**：処方薬、市販薬、ハーブ系または嗜好用薬物を摂取している方は、ご自身の医療提供者に伝えてください。個々の薬物相互作用については、本文書には記載しません。
- アジスロマイシンは、アルミニウムおよび／またはマグネシウムを含む制酸剤と併用しないでください。少なくとも2時間の間隔をあけて服用してください。
- 既往の心臓病、不整脈または電解質異常（徐脈、QT 間隔延長、低カリウム血症、低マグネシウム血症など）がある場合は、ご自身の医療提供者に伝えてください。
- ジスロマイシン服用中は、以下の薬剤を使用しないでください。
 - 抗精神病：ピモジド（Orap[®]）、ジプラシドン（Zeldox[®]）
 - 心臓：ドロネダロン（Multaq[®]）
 - 片頭痛：ジヒドロエルゴタミン（Migranal[®]）、エルゴタミン（Cafergot[®]）

アジスロマイシン (続き) Azithromycin (cont'd)

副作用 (Side Effects)

- 下痢、吐き気、腹痛または嘔吐が起こることがあります。

服用上の注意 (Instructions for Taking)

- アジスロマイシンは、食物と一緒に、または別に服用してください。
- ご自身の医療提供者の処方指示に従ってください。

保管上の注意 (Storage Instructions)

- 15～30°Cの室温で保存してください。
- 光、熱、湿度を避けてください。
- 記載された有効期限を過ぎたものは使用しないでください。
- 子供の手の届かないところに保管してください。

特別な指示 (Special Instructions)

- 以下の時期まで性行為を避けてください。
 - 治療完了から一週間が経過した時点、またはご自身の医療提供者の指示する時期、かつ、
 - あなたのパートナー（たち）も治療を受け、かつ 治療開始から一週間が経過した時点まで。これはパートナー（たち）の検査結果が陰性であった場合も同様です。
- 未治療のパートナーと性行為を行った場合、または、あなたご自身またはパートナー（たち）が治療完了前に性行為を行った場合、あなたには再治療が必要になります。ご自身の医療提供者にご相談ください。

ご質問または詳しい情報をご希望の場合は、www.smartsexresource.com にアクセスするか、またはご自身の医療提供者にご連絡ください。