

# 阿奇霉素 (AZITHROMYCIN)

---

阿奇霉素(Azithromycin)是用于治疗某些性传播感染疾病的口服抗生素。

## 过敏 (Allergies)

- 如果您对任何大环内酯类抗生素（如阿奇霉素、红霉素或克拉霉素）过敏，请告知医务人员。

## 怀孕/哺乳 (Pregnancy and Breast/Chest feeding)

- 怀孕和哺乳期间可谨慎使用阿奇霉素。请咨询医务人员。

## 警告 (CAUTION)

- 请勿在服用阿奇霉素的同时服用含有铝和/或镁的抗酸剂。两种药物应间隔至少两小时服用。
- 如果您患有肝病、肾病和/或任何既往存在的心脏病、心律失常或电解质紊乱（例如心动过缓、QT 间期延长、低钾血症、低镁血症），请通知医务人员。
- 药物相互作用：请注意，本文件不再列出个别药物的相互作用。如果您在服用任何处方药、非处方药、草药或消遣性药物产品，请与医务人员讨论。

## 副作用 (Side effects)

- 您可能会出现腹泻、恶心、腹痛或呕吐。

## 服药说明 (Instructions for Taking)

- 饭前饭后均可服用阿奇霉素。
- 请遵循医务人员的剂量指示。

## 贮存说明 (Storage Instructions)

- 贮存于 15-30°C 室温下。
- 避光、防高温、防潮。
- 药物超出印刷的失效日期，切勿使用。
- 谨防儿童接触。

## 特殊说明 (Special Instructions)

- 在满足下列条件之前，不要进行性生活：
  - 您的治疗开始后已满一周；或根据医嘱，**并且**
  - 任何现有伴侣开始治疗也已满一周，即使他们的检测结果为阴性亦需治疗。
- 如果您与未经治疗的伴侣发生性关系，或是在您或伴侣的治疗完成之前发生性行为，则需重新治疗。请与医务人员讨论。

如果您有疑问或需要更多信息，请访问 [www.smartsexresource.com](http://www.smartsexresource.com) 或联系医务人员。