



BC Centre for Disease Control
Provincial Health Services Authority

Clinical Prevention Services
Provincial STI/HIV Clinic

655 West 12th Avenue
Vancouver, BC V5Z 4R4

Tel 604.707.5600
Fax 604.707.5604

www.bccdc.ca
www.SmartSexResource.com

Azitromicina Azithromycin

La azitromicina es un antibiótico que se toma por vía oral para el tratamiento de ciertas infecciones de transmisión sexual (ITS).

Alergias (Allergies)

- Informe a su proveedor de atención médica si tiene alergia a algún **antibiótico macrólido**, como la azitromicina (Z-pak[®], Zithromax[®]), eritromicina o claritromicina (Biaxin[®]).

Embarazo y lactancia (Pregnancy and Chest/Breastfeeding)

- La azitromicina puede usarse con precaución durante el embarazo y la lactancia. Consulte a su proveedor de atención médica.

ADVERTENCIA (CAUTION)

- **Interacciones medicamentosas:** informe a su proveedor de atención médica si toma algún producto recetado, de venta libre, a base de hierbas o recreativo. Este documento no contiene todas las interacciones medicamentosas individuales.
- **No tome antiácidos que contengan aluminio o magnesio** al mismo tiempo que toma azitromicina. Tómelos con al menos dos horas de diferencia.
- **Informe a su proveedor de atención médica si tiene afecciones cardíacas, alteraciones de los electrolitos o arritmia preexistentes**, p. ej., bradicardia, prolongación del intervalo QT, hipopotasemia, hipomagnesemia.
- **No tome los siguientes medicamentos mientras toma azitromicina:**
 - **Antipsicóticos:** pimozida (Orap[®]), ziprasidona (Zeldox[®])
 - **Cardíacos:** dronedarona (Multaq[®])
 - **Migraña:** dihidroergotamina (Migranal[®]), ergotamina (Cafergot[®])

Efectos secundarios (Side Effects)

- Es posible que presente diarrea, náusea, dolor abdominal o vómito.

Instrucciones para su uso (Instructions for Taking)

- La azitromicina puede tomarse con o sin alimentos.
- Siga las instrucciones de dosificación de su proveedor de atención médica.

Azitromicina (continuación) Azithromycin (cont'd)

Instrucciones de almacenaje (Storage Instructions)

- Almacenar a temperatura ambiente entre 15 y 30 °C.
- Proteger de la luz, el calor y la humedad.
- No consumir los medicamentos después de la fecha de caducidad impresa.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

Instrucciones especiales (Special Instructions)

- No tenga relaciones sexuales:
 - hasta 1 semana después de completar su tratamiento, o según las recomendaciones de su proveedor de atención médica, **y**
 - hasta que su(s) pareja(s) sexual(es) también haya(n) recibido tratamiento **y** haya pasado una semana desde el inicio de su tratamiento, aunque los resultados de su prueba sean negativos.
- Tendrá que volver a recibir tratamiento si tiene relaciones sexuales con una pareja que no haya recibido tratamiento, o si tiene relaciones sexuales antes de que su tratamiento o el de su pareja hayan terminado. Consulte a su proveedor de atención médica.

Si tiene alguna pregunta o si necesita información adicional, visite www.smartsexresource.com o comuníquese con su proveedor de atención médica.