BC Centre for Disease Control
Provincial Health Services Authority

STI/HIV Services
Clinical Prevention Services
655 West 12th Avenue
Vancouver, BC V5Z 4R4

604.707.5600
604.707.5604
bccdc.ca
SmartSexResource.com

AZITROMICINA (AZITHROMYCIN)

La azitromicina es un antibiótico que se toma por vía oral para el tratamiento de ciertas infecciones de transmisión sexual (ITS).

Alergias (Allergies)

- Informe a su proveedor de atención médica si tiene alergia a algún antibiótico macrólido, como la azitromicina, la eritromicina o la claritromicina.

Embarazo y lactancia (Pregnancy and Chest/Breastfeeding)

- La azitromicina puede usarse con precaución durante el embarazo y la lactancia. Consulte a su proveedor de atención médica.

ADVERTENCIA (CAUTION)

- No tome antiácidos que contengan aluminio o magnesio al mismo tiempo que toma azitromicina. Tómelos con al menos dos horas de diferencia.
- Informe a su proveedor de atención médica si tiene alguna enfermedad hepática o enfermedad renal, o si tiene alguna afección cardíaca, alteración de los electrolitos o arritmia preexistentes (p. ej., bradicardia, prolongación del intervalo QT, hipopotasemia, hipomagnesemia).
- Interacciones medicamentosas: tenga en cuenta que este documento ya no incluye las interacciones medicamentosas individuales. Hable con su proveedor de atención médica si toma algún producto recetado, de venta libre, a base de hierbas o recreativo.

Efectos secundarios (Side Effects)

- Es posible que presente diarrea, náusea, dolor abdominal, vómito, dolor de cabeza y mareo.

Instrucciones para su uso (Instructions for Taking)

- La azitromicina puede tomarse con o sin alimentos.
- Siga las instrucciones de dosificación de su proveedor de atención médica.

Last review by BCCDC Pharmacy: May 2025

Instrucciones de almacenaje (Storage Instructions)

- Almacenar a temperatura ambiente entre 15 y 30 °C.
- Proteger de la luz, el calor y la humedad.
- No consumir los medicamentos después de la fecha de caducidad impresa.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

Instrucciones especiales (Special Instructions)

- No tenga relaciones sexuales:
  - hasta una semana después de completar su tratamiento, o según las recomendaciones de su proveedor de atención médica, Y
  - hasta una semana después de que su(s) pareja(s) continua(s) haya(n) iniciado su tratamiento, aunque los resultados de su prueba sean negativos.
- Tendrá que volver a recibir tratamiento si tiene relaciones sexuales con una pareja que no haya recibido tratamiento, o si tiene relaciones sexuales antes de que su tratamiento o el de su pareja hayan terminado. Consulte a su proveedor de atención médica.

Si tiene alguna pregunta o si necesita información adicional, visite www.smartsexresource.com o comuníquese con su proveedor de atención médica.