



BC Centre for Disease Control  
Provincial Health Services Authority

Clinical Prevention Services  
Provincial STI/HIV Clinic

Tel 604.707.5600  
Fax 604.707.5604

655 West 12th Avenue  
Vancouver, BC V5Z 4R4

www.bccdc.ca  
www.SmartSexResource.com

## セフィキシム Cefixime

セフィキシム(Suprax®)は、特定の性感染症 (STI)の治療のために経口で服用する抗生物質です。

### アレルギー (Allergies)

- ペニシリン VK、アモキシシリン (Amoxil®) などのペニシリン系抗生物質、またはセフィキシム (Suprax®)、セフトリアキソン (Rocephin®) などのセファロスポリン系抗生物質の摂取でアナフィラキシーアレルギー反応または即時反応が起きたことがある場合は、ご自身の医療提供者に伝えてください。

### 妊娠および授乳 (Pregnancy and Chest/Breastfeeding)

- セフィキシムは、妊娠中および授乳中に慎重に注意して使用することができます。ご自身の医療提供者に相談してください。

### 注意 (CAUTION)

- 薬物相互作用：処方薬、市販薬、ハーブ系または嗜好用薬物を摂取している方は、ご自身の医療提供者に伝えてください。個々の薬物相互作用については、本文書には記載しません。
- 経口腸チフスワクチン (Vivotif®) の投薬を受ける場合は、セフィキシムの最後の服用から 24 時間以上あけてください。

### 副作用 (Side Effects)

- 頭痛、下痢、吐き気、腹痛、および/または腸内ガスの発生が起きることがあります。
- 次のアレルギー反応が出た場合は、すぐに緊急医療に助けを求めてください：発疹、呼吸困難、顔面顔面・唇・舌・喉の腫れ。

## セフィキシム (続き) Cefixime (cont'd)

### 服用上の注意 (Instructions for Taking)

- セフィキシムは通常、単回投与で処方されます。ご自身の医療提供者の処方指示に従ってください。
- セフィキシムは、胃もたれを防ぐために食物と一緒に服用してください。

### 保管上の注意 (Storage Instructions)

- 15～30°Cの室温で保存してください。
- 光、熱、湿度を避けてください。
- 記載された有効期限を過ぎたものは使用しないでください。
- 子供の手の届かないところに保管してください。

### 特別な指示 (Special Instructions)

- 以下の時期まで性行為を避けてください。
  - あなたご自身の一回治療の一週間後、かつ、
  - あなたのパートナー（たち）も治療を受け、かつ、治療開始から一週間が経過した時点まで。これはパートナー（たち）の検査結果が陰性であった場合も同様です。
- 未治療のパートナーと性行為を行った場合、または、あなたご自身またはパートナー（たち）が治療完了前に性行為を行った場合、あなたには再治療が必要になります。ご自身の医療提供者にご相談ください。

ご質問または詳しい情報をご希望の場合は、[www.smartsexresource.com](http://www.smartsexresource.com) にアクセスするか、またはご自身の医療提供者にご連絡ください。