



세픽심 Cefixime

세픽심(Suprax®)은 특정 성 매개 감염(STI) 치료용으로 복용하는 항생제입니다.

알레르기(Allergies)

- 페니실린 V-K, 아목시실린(amoxicillin)(Amoxil®) 같은 페니실린계 항생제 또는 세픽심(Suprax®), 세프트리악손(ceftriaxone)(Rocephin®) 같은 세팔로스포린(cephalosporin)계 항생제에 대하여 **아나필락시스 알레르기나 즉시 반응 병력**이 있으시면 의료 제공자에게 알려주십시오.

임신과 수유(Pregnancy and Chest/Breastfeeding)

- 세픽심은 임신과 수유 기간에 주의하여 사용하셔도 됩니다. 의료 제공자와 상담하시기 바랍니다.

주의 사항(CAUTION)

- **약물 상호 작용:** 처방 약이나 비처방 약, 생약, 기분 전환용 제품을 복용 중이시면 의료 제공자에게 알려주십시오. 개개의 모든 약물 상호 작용이 이 문서에 기재되어 있는 것은 아닙니다.
- 세픽심 마지막 용량 투여와 경구 장티푸스 백신(Vivotif®) 투여 사이에 **24 시간 이상** 간격을 두십시오.

부작용(Side Effects)

- 두통이나 설사, 메스꺼움, 복통 및/또는 가스 발생이 있을 수 있습니다.
- 다음과 같은 알레르기 반응의 징후가 있으면 즉시 응급 진료를 받으십시오: 두드러기, 호흡 곤란 또는 얼굴, 입술, 혀, 목구멍의 부기

복용 방법(Instructions for Taking)

- 세픽심은 대개 1 회 단일 용량으로 처방됩니다. 의료 제공자가 지시하는 용량을 따르십시오.
- 약을 식후에 복용하여 배앓이 위험을 줄이십시오.

보관 방법(Storage Instructions)

- 15~30°C 의 실온에 보관하십시오.
- 빛, 열, 습기로부터 보호하십시오.
- 표시된 유효 기간이 지난 약은 사용하지 마십시오.
- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 두십시오.



BC Centre for Disease Control
Provincial Health Services Authority

세픽심(계속) Cefixime (cont'd)

특별 주의 사항(Special Instructions)

- 다음 시점까지 성관계를 갖지 마십시오.
 - 1 일 치료 후 1 주일 **및**
 - 검사 결과가 음성이어도 성관계 파트너 역시 치료를 받았고 **또한** 성관계 파트너의 치료가 시작된 이후 1 주일이 경과함
- 치료를 받지 않은 파트너와 성관계를 하시는 경우 또는 본인이나 파트너의 치료가 완료되기 전에 성관계를 하시는 경우 재치료를 받으셔야 합니다. 의료 제공자와 상의하시기 바랍니다.

궁금한 점이 있거나 정보가 더 필요하시면 www.smartsexresource.com 을 보시거나 의료 제공자에게 연락하시기 바랍니다.