

# 头孢克肟 (CEFIXIME)

头孢克肟是用于治疗某些性传播感染疾病的口服抗生素。

## 过敏 (Allergies)

- 如果您对头孢呋辛、头孢噻肟、头孢他啶、头孢曲松和头孢吡肟过敏，请告知医务人员。

## 怀孕/哺乳 (Pregnancy and Breast/Chest feeding)

- 怀孕和哺乳期间可谨慎使用头孢克肟。请咨询医务人员。

## 警告 (CAUTION)

- 如果您正在接受头孢克肟治疗，切勿注射以下疫苗：
  - 卡介苗 - 膀胱内注射 - 请咨询医务人员
  - 霍乱疫苗 (Vaxchora®)，在抗生素治疗后 14 天之内
  - 口服伤寒疫苗 (Vivotif®)，在抗生素治疗后 3 天之内
- **药物相互作用：** 请注意，本文件不再列出个别药物的相互作用。如果您在服用任何处方药、非处方药、草药或消遣性药物产品，请与医务人员讨论。

## 副作用 (Side effects)

- 您可能会出现头痛、腹泻、恶心、腹痛和/或胀气。
- 如果您有以下过敏反应症状，请立即挂急诊：荨麻疹，呼吸困难，脸、嘴唇、舌头和喉咙肿胀。

## 服药说明 (Instructions for Taking)

- 头孢克肟通常按照一次性单剂量开处方。请遵循医务人员的剂量指示。
- 饭后服药，减少胃部不适的发生机率。

## 贮存说明 (Storage Instructions)

- 贮存于 15-30°C 室温下。
- 避光、防高温、防潮。
- 药物超出印明的失效日期，切勿使用。
- 谨防儿童接触。

## 特殊说明 (Special Instructions)

- 在满足下列条件之前，不要进行性生活：
  - 为期 1 天的治疗结束后已满一周；**并且**
  - 您的性伴侣也接受了治疗，**而且**自治疗开始后已满一周，即使他们的检测结果为阴性亦需治疗。
- 如果您与未经治疗的伴侣发生性关系，或是在您或伴侣的治疗完成之前发生性行为，则需重新治疗。请与医务人员讨论。

如果您有疑问或需要更多信息，请访问 [www.smartsexresource.com](http://www.smartsexresource.com) 或联系医务人员。