

CEFIXIMA (CEFIXIME)

La cefixima es un antibiótico que se toma por vía oral para el tratamiento de ciertas infecciones de transmisión sexual (ITS).

Alergias (Allergies)

- Informe a su proveedor de atención médica si tiene alergia a la cefuroxima, la cefotaxima, la ceftazidima, la ceftriaxona y la cefepima.

Embarazo y lactancia (Pregnancy and Breast/Chest Feeding)

- La cefixima puede usarse con cautela durante el embarazo y la lactancia. Consulte a su proveedor de atención médica.

ADVERTENCIA (CAUTION)

- Si recibe una dosis de cefixima, no se aplique las siguientes vacunas:
 - Vacuna BCG – intravesical – consulte a su proveedor de atención médica
 - Vacuna contra el cólera (Vaxchora[®]) en un plazo de 14 días a partir de la terapia con antibiótico
 - Vacuna oral contra la fiebre tifoidea (Vivotif[®]) en un plazo de 3 días a partir de la terapia con antibiótico
- **Interacciones medicamentosas:** tenga en cuenta que este documento ya no incluye las interacciones medicamentosas individuales. Hable con su proveedor de atención médica si toma algún producto recetado, de venta libre, a base de hierbas o recreativo.

Efectos secundarios (Side Effects)

- Es posible que presente dolor de cabeza, diarrea, náusea, dolor abdominal o gases.
- Busque de inmediato ayuda médica urgente si tiene los siguientes signos de una reacción alérgica: sarpullido, urticaria, comezón, dificultad para respirar o hinchazón del rostro, los labios, la lengua y la garganta.

Instrucciones para su uso (Instructions for Taking)

- La cefixima generalmente se receta en una sola dosis.
- Puede tomar el medicamento con alimentos para reducir la posibilidad de sufrir de molestia estomacal.

Instrucciones de almacenamiento (Storage Instructions)

- Almacenar a temperatura ambiente entre 15 y 30 °C.
- Proteger de la luz, el calor y la humedad.
- No consumir los medicamentos después de la fecha de caducidad impresa.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

Instrucciones especiales (Special Instructions)

- No tenga relaciones sexuales:
 - Hasta una semana después de completar su tratamiento de un día; Y
 - Hasta que su(s) pareja(s) sexual(es) también haya(n) recibido tratamiento y haya pasado una semana desde el inicio de su tratamiento, aunque los resultados de su prueba sean negativos.
- Tendrá que volver a recibir tratamiento si tiene relaciones sexuales con una pareja que no haya recibido tratamiento, o si tiene relaciones sexuales antes de que el tratamiento suyo o de su pareja haya terminado. Consulte a su proveedor de atención médica.

Si tiene alguna pregunta o si necesita información adicional, visite www.smartsexresource.com o comuníquese con su proveedor de atención médica.