



BC Centre for Disease Control
Provincial Health Services Authority

Clinical Prevention Services
Provincial STI/HIV Clinic

655 West 12th Avenue
Vancouver, BC V5Z 4R4

Tel 604.707.5600
Fax 604.707.5604

www.bccdc.ca
www.SmartSexResource.com

Cefixima Cefixime

La cefixima (Suprax[®]) es un antibiótico que se toma por vía oral para el tratamiento de ciertas infecciones de transmisión sexual (ITS).

Alergias (Allergies)

- Informe a su proveedor de atención médica si tiene **antecedentes de una alergia anafiláctica o una reacción inmediata** a cualquier antibiótico a base de penicilina, como la penicilina V-K, la amoxicilina (Amoxil[®]) o cualquier antibiótico a base de cefalosporina, como la cefixima (Suprax[®]) y la ceftriaxona (Rocephin[®]).

Embarazo y lactancia (Pregnancy and Chest/Breastfeeding)

- La cefixima puede usarse con cautela durante el embarazo y la lactancia. Consulte a su proveedor de atención médica.

ADVERTENCIA (CAUTION)

- **Interacciones medicamentosas:** informe a su proveedor de atención médica si toma algún producto recetado, de venta libre, a base de hierbas o recreativo. Este documento no contiene todas las interacciones medicamentosas individuales.
- Permita que pasen 24 horas o más entre la administración de la última dosis de cefixima y la vacuna oral contra la fiebre tifoidea (Vivotif[®]).

Efectos secundarios (Side Effects)

- Es posible que presente dolor de cabeza, diarrea, náusea, dolor abdominal o gases.
- Busque de inmediato ayuda médica urgente si tiene los siguientes signos de una reacción alérgica: urticaria, dificultad para respirar o hinchazón del rostro, los labios, la lengua y la garganta.

Instrucciones para su uso (Instructions for Taking)

- La cefixima generalmente se receta en una sola dosis. Siga las instrucciones de dosificación que le dé su proveedor de atención médica.
- Tome el medicamento con alimentos para reducir la posibilidad de sufrir de molestia estomacal.

Instrucciones de almacenaje (Storage Instructions)

- Almacenar a temperatura ambiente entre 15 y 30 °C.
- Proteger de la luz, el calor y la humedad.
- No consumir los medicamentos después de la fecha de caducidad impresa.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

Cefixima (continuación)

Cefixime (cont'd)

Instrucciones especiales (Special Instructions)

- No tenga relaciones sexuales:
 - Hasta una semana después de completar su tratamiento de un día; **y**
 - Hasta que su(s) pareja(s) sexual(es) también haya(n) recibido tratamiento **y** haya pasado una semana desde el inicio de su tratamiento, aunque los resultados de su prueba sean negativos.
- Tendrá que volver a recibir tratamiento si tiene relaciones sexuales con una pareja que no haya recibido tratamiento, o si tiene relaciones sexuales antes de que el tratamiento suyo o de su pareja haya terminado. Consulte a su proveedor de atención médica.

Si tiene alguna pregunta o si necesita información adicional, visite www.smartsexresource.com o comuníquese con su proveedor de atención médica.