



BC Centre for Disease Control
Provincial Health Services Authority

Clinical Prevention Services
Provincial STI/HIV Clinic

655, 12^e avenue ouest
Vancouver, C.-B. V5Z 4R4

Tél : 604-707-5600
Télééc. : 604-707-5604

www.bccdc.ca
www.SmartSexResource.com

Ceftriaxone Ceftriaxone

La ceftriaxone est un antibiotique administré par injection dans un muscle pour le traitement de certaines infections sexuellement transmissibles (IST).

Allergies (Allergies)

- Informez votre fournisseur de soins de santé si vous avez **des antécédents d'allergie anaphylactique ou de réaction immédiate** à un antibiotique de pénicilline tel que la pénicilline V-K, l'amoxicilline (Amoxil^{MD}) ou un antibiotique de céphalosporine tel que la céfixime (Suprax^{MD}) ou la ceftriaxone (Rocephin^{MD}).
- Si vous avez une allergie à la lidocaïne ou à un autre anesthésique local du type amide, parlez-en à votre fournisseur de soins de santé, p. ex la prilocaïne (la lidocaïne est mélangée à de la ceftriaxone pour réduire la douleur au site d'injection).

Grossesse et allaitement (Pregnancy and Chest/Breastfeeding)

La ceftriaxone peut être utilisée avec précaution pendant la grossesse et l'allaitement. Veuillez consulter votre fournisseur de soins de santé.

MISES EN GARDE (CAUTION)

- **Interactions médicamenteuses** : Informez votre fournisseur de soins de santé si vous prenez des produits sur ordonnance, en vente libre, à base de plantes ou récréatifs. Toutes les interactions médicamenteuses individuelles ne sont pas répertoriées dans ce document.
- Si vous avez des troubles de la vésicule biliaire, du foie, des reins, du pancréas ou des saignements, ou si vous avez des antécédents de dysfonctionnement de l'estomac, en particulier une colite, parlez-en à votre fournisseur de soins de santé.
- Ne prenez pas les médicaments suivants avec la ceftriaxone :
 - vaccin oral contre la typhoïde (Vivotif^{MD}).
- La ceftriaxone peut interférer avec certains tests de glucose dans les urines (Clinitest^{MD}).
- La ceftriaxone est contre-indiquée chez les nouveau-nés prématurés ou les nourrissons de moins d'un mois présentant des taux sanguins élevés de bilirubine.

Ceftriaxone (suite) Ceftriaxone (cont'd)

Effets secondaires (Side Effects)

- Vous pouvez ressentir une gêne, une rougeur ou un gonflement au site d'injection.
- Vous pouvez avoir des éruptions cutanées ou des diarrhées.
- Si l'un de ces effets persiste ou s'aggrave, veuillez contacter votre fournisseur de soins de santé.

Soins après traitement (Care Following Treatment)

- Veuillez attendre à la clinique 15 minutes après votre injection.
- Si vous présentez une réaction après le traitement (par exemple éruptions cutanées, démangeaisons, difficultés respiratoires), veuillez en informer immédiatement un membre du personnel.
- Si ces symptômes se manifestent après avoir quitté la clinique, veuillez demander immédiatement l'aide d'un médecin.

Instructions spéciales (Special Instructions)

- N'ayez pas de relations sexuelles pendant :
 - une semaine après la fin du traitement par la ceftriaxone; **et**
 - une semaine après que vos partenaires sexuels ont terminé leurs traitements, même si les résultats de leurs tests sont négatifs.
- Vous devrez suivre un nouveau traitement si vous avez des relations sexuelles avec un partenaire qui n'a pas été traité ou si vous avez des rapports avant même que toutes les parties concernées aient terminées leurs traitements. Veuillez en parler avec votre fournisseur de soins de santé.

Si vous avez des questions ou avez besoin de plus d'informations, consultez www.smartsexresource.com ou contactez votre fournisseur de soins de santé.