



BC Centre for Disease Control
Provincial Health Services Authority

Clinical Prevention Services
Provincial STI/HIV Clinic

655 West 12th Avenue
Vancouver, BC V5Z 4R4

Tel 604.707.5600
Fax 604.707.5604

www.bccdc.ca
www.SmartSexResource.com

セフトリアキソン Ceftriaxone

セフトリアキソンは、特定の性感染症（STI）の治療のために筋肉注射で投与する抗生物質です。

アレルギー（Allergies）

- ペニシリン VK、アモキシシリン（Amoxil®）などのペニシリン系抗生物質、またはセフィキシム（Suprax®）やセフトリアキソン（Rocephin®）などのセファロスポリン系抗生物質の摂取でアナフィラキシーアレルギー反応または即時反応が起きたことがある場合は、ご自身の医療提供者に伝えてください。
- リドカイン、またはプリロカインのようなアミドタイプの局部麻酔薬にアレルギーがある場合は、ご自身の医療提供者に伝えてください（注射部位の痛みを和らげるためにセフトリアキソンにリドカインを加えるため）。

妊娠および授乳（Pregnancy and Breastfeeding）

- セフトリアキソンは、妊娠中および授乳中に慎重に注意して使用することができます。ご自身の医療提供者に相談してください。

注意（CAUTION）

- **薬物相互作用：**処方薬、市販薬、ハーブ系または嗜好用薬物を摂取している方は、ご自身の医療提供者に伝えてください。個々の薬物相互作用については、本文書には記載しません。
- 胆嚢、肝臓、腎臓、膵臓の疾患や出血性疾患がある場合、または、胃腸の機能障害、特に大腸炎を経験したことがある場合は、ご自身の医療提供者に伝えてください。
- セフトリアキソンは、以下の薬剤と併用しないでください。
 - 経口腸チフスワクチン（Vivotif®）
- セフトリアキソンは、特定の尿中ブドウ糖検査の結果に影響を与えることがあります。（Clinitest®）
- 早生児または生後一か月未満で血中ビリルビン濃度が高い乳児へのセフトリアキシソンの使用は禁忌です。

セフトリアキソン (続き) Ceftriaxone (cont'd)

副作用 (Side Effects)

- 注射部位に不快感、発赤、または腫れが起こることがあります。
- 皮膚の発疹または下痢が起こるかもしれません。
- このような副作用が継続または悪化する場合は、ご自身の医療提供者に連絡してください。

治療後のケア (Care Following Treatment)

- 注射後 15 分間はクリニックで待機してください。
- 治療後に反応が出た場合（発疹、痒み、呼吸困難など）は、スタッフにすぐに知らせてください。
- クリニックを出た後でこうした反応が出た場合は、直ちに緊急医療に助けを求めてください。

特別な指示 (Special Instructions)

- 以下の時期まで性行為を避けてください。
 - セフトリアキソンでの治療完了から一週間が経過した時点、**かつ**
 - あなたのパートナー（たち）が治療完了から一週間が経過した時点まで。これはパートナー（たち）の検査結果が陰性であった場合も同様です。
- 未治療のパートナーと性行為を行った場合、または、あなたご自身またはパートナー（たち）が治療完了前に性行為を行った場合、あなたには再治療が必要になります。ご自身の医療提供者にご相談ください。

ご質問または詳しい情報をご希望の場合は、www.smartsexresource.com にアクセスするか、またはご自身の医療提供者にご連絡ください。