



BC Centre for Disease Control
Provincial Health Services Authority

Clinical Prevention Services
Provincial STI/HIV Clinic

Tel 604.707.5600
Fax 604.707.5604

655 West 12th Avenue
Vancouver, BC V5Z 4R4

www.bccdc.ca
www.SmartSexResource.com

세프트리아손 Ceftriaxone

세프트리아손은 특정 성 매개 감염(STI) 치료용으로 근육에 주사로 투여하는 항생제입니다.

알레르기(Allergies)

- 페니실린 V-K, 아목시실린(amoxicillin)(Amoxil®) 같은 페니실린계 항생제 또는 세픽심(Suprax®), 세프트리아손(Rocephin®) 같은 세팔로스포린(cephalosporin)계 항생제에 대하여 **아나필락시스 알레르거나 즉시 반응 병력**이 있으시면 의료 제공자에게 알려주십시오.
- 리도카인(lidocaine) 또는 프틸로카인(prilocaine) 같은 아미드(amide)계의 기타 국소 마취제에 알레르기가 있으시면 의료 제공자에게 알려주십시오(리도카인은 세프트리아손과 혼합하여 주사 부위의 통증을 줄여줍니다).

임신과 수유(Pregnancy and Chest/Breastfeeding)

세프트리아손은 임신과 수유 기간에 주의하여 사용하셔도 됩니다. 의료 제공자와 상담하시기 바랍니다.

주의 사항(CAUTION)

- **약물 상호 작용:** 처방 약이나 비처방 약, 생약, 기분 전환용 제품을 복용 중이시면 의료 제공자에게 알려주십시오. 개개의 모든 약물 상호 작용이 이 문서에 기재되어 있는 것은 아닙니다.
- 쓸개, 간, 콩팥, 췌장, 출혈 장애가 있거나 위 기능 장애, 특히 대장염 병력이 있으시면 의료 제공자에게 알려주십시오.
- 다음 약을 세프트리아손과 함께 사용하지 마십시오.
 - 경구 장티푸스 백신(Vivotif®)
- 세프트리아손은 특정 요당 검사에 방해가 될 수 있습니다. (Clinitest®)
- 세프트리아손은 미숙아나 혈중 빌리루빈 수치가 높은 생후 1 개월 미만 젖먹이에게 사용이 금지되어 있습니다.

부작용(Side Effects)

- 주사 부위에 불편감이나 빨개짐, 부기가 있을 수 있습니다.
- 피부 발진이나 설사가 있을 수 있습니다.
- 이 중 어느 부작용이든 지속하거나 악화하면 의료 제공자에게 연락하시기 바랍니다.



BC Centre for Disease Control
Provincial Health Services Authority

세프트리아kson(계속) Ceftriaxone (cont'd)

치료 후 관리(Care Following Treatment)

- 주사 후 클리닉에서 15 분간 기다리십시오.
- 치료 후 어떤 반응이든 나타나면(예: 발진, 가려움, 호흡 곤란) 직원에게 즉시 알려십시오.
- 클리닉을 떠나신 후 이런 증상이 발생하면 즉시 응급 진료를 받으십시오.

특별 주의 사항(Special Instructions)

- 다음 시점까지 성관계를 갖지 마십시오.
 - 세프트리아kson 치료 완료 후 1 주일 **및**
 - 검사 결과가 음성이어도 성관계 파트너가 치료를 완료한 후 1 주일
- 치료를 받지 않은 파트너와 성관계를 하시는 경우 또는 본인이나 파트너의 치료 기간이 완료되기 전에 성관계를 하시는 경우 재치료를 받으셔야 합니다. 의료 제공자와 상의하시기 바랍니다.

궁금한 점이 있거나 정보가 더 필요하시면 www.smartsexresource.com 을 보시거나 의료 제공자에게 연락하시기 바랍니다.