

头孢曲松 (CEFTRIAXONE)

头孢曲松是用于某些性传播感染疾病的肌肉注射抗生素。

过敏 (Allergies)

如果您对以下任何药物过敏,请告知医务人员:

- 其他头孢菌素类抗生素(例如头孢呋辛、头孢克肟、头孢噻肟、头孢他啶和头孢吡肟)
- 利多卡因或其他局部麻醉剂或酰胺类药物(例如丙胺卡因)。利多卡因与头孢曲松混合,用于减轻注射部位的疼痛。

怀孕/哺乳 (Pregnancy and Breast/Chest feeding)

• 怀孕和哺乳期间可谨慎使用头孢曲松。请咨询医务人员。

警告 (CAUTION)

- 如果您有任何胆囊、肝脏、肾脏、胰腺或出血性疾病,或者有胃功能障碍史,特别是结肠炎,请告知医务人员。
- 如果您正在接受头孢曲松治疗,切勿注射以下疫苗:
 - 卡介苗-膀胱内注射-请咨询医务人员
 - o 霍乱疫苗 (Vaxchora®), 在抗生素治疗后 14 天之内
 - o 口服伤寒疫苗 (Vivotif®), 在抗生素治疗后 3 天之内
- 头孢曲松可干扰某些铜还原法尿糖检测
- 头孢曲松不得用于治疗早产儿、出生后 28 天以内的婴儿以及高胆红素血症的新生儿
- **药物相互作用:** 请注意,本文件不再列出个别药物的相互作用。如果您在服用任何处方药、非处方药、草药或消遣性药物产品,请与医务人员讨论。

副作用 (Side Effects)

- 您可能会感到注射部位不适、发红或肿胀。
- 您可能会出现腹泻。
- 如果上述任何副作用持续或恶化,请联系医务人员。

治疗后的护理 (Care Following Treatment)

- 注射后请在诊所等候 15 分钟。
- 如果您在治疗后有任何反应(如皮疹、瘙痒、呼吸困难),请立即通知工作人员。
- 如果离开诊所后出现这些症状,请立即看急诊。

特殊说明 (Special Instructions)

- 在满足下列条件之前,不要进行性生活:
 - o 单剂量治疗后已满一周,或您已完成7天疗程,并且
 - 。 您的性伴侣也已接受治疗,而且自治疗开始以来已满一周,即使他们的检测结果为阴性亦 需治疗。
- 如果您与未经治疗的伴侣发生性关系,或是在您或伴侣的治疗完成之前发生性行为,则需重新治疗。请与医务人员讨论。

如果您有疑问或需要更多信息,请访问 www.smartsexresource.com 或联系医务人员。