



BC Centre for Disease Control
Provincial Health Services Authority

Clinical Prevention Services
Provincial STI/HIV Clinic

655 West 12th Avenue
Vancouver, BC V5Z 4R4

Tel 604.707.5600
Fax 604.707.5604

www.bccdc.ca
www.SmartSexResource.com

Ceftriaxona Ceftriaxone

La ceftriaxona es un antibiótico que se administra mediante una inyección intramuscular para el tratamiento de ciertas infecciones de transmisión sexual (ITS).

Alergias (Allergies)

- Informe a su proveedor de atención médica si tiene **antecedentes de una alergia anafiláctica o una reacción inmediata** a cualquier antibiótico a base de penicilina, como la penicilina V-K, la amoxicilina (Amoxil®) o cualquier antibiótico a base de cefalosporina, como la cefixima (Suprax®) y la ceftriaxona (Rocephin®).
- Informe a su proveedor de atención médica si tiene alguna alergia a la lidocaína o a otros anestésicos locales del grupo de las amidas, p. ej., a la prilocaína (se mezcla lidocaína con ceftriaxona para reducir el dolor en el sitio de la inyección).

Embarazo y lactancia (Pregnancy and Breastfeeding)

La ceftriaxona puede usarse con cautela durante el embarazo y la lactancia. Consulte a su proveedor de atención médica.

ADVERTENCIA (CAUTION)

- **Interacciones medicamentosas:** informe a su proveedor de atención médica si toma algún producto recetado, de venta libre, a base de hierbas o recreativo. Este documento no contiene todas las interacciones medicamentosas individuales.
- Informe a su proveedor de atención médica si tiene algún trastorno de la vesícula, del hígado, de los riñones, del páncreas o algún trastorno de sangrado, o bien, si tiene antecedentes de disfunción estomacal, particularmente colitis.
- No tome los siguientes medicamentos con ceftriaxona:
 - Vacuna oral contra la fiebre tifoidea (Vivotif®).
- La ceftriaxona puede interferir con ciertas pruebas de glucosa en orina (Clinitest®).
- La ceftriaxona está contraindicada en recién nacidos prematuros o en bebés menores de un mes con altos niveles de bilirrubina en la sangre.

Efectos secundarios (Side Effects)

- Es posible que sufra de molestia, enrojecimiento o inflamación en el sitio de la inyección.
- Podría presentar salpullido o diarrea.
- Si alguno de estos efectos persiste o empeora, comuníquese con su proveedor de atención médica.

Ceftriaxona (continuación) Ceftriaxone (cont'd)

Atención después del tratamiento (Care Following Treatment)

- Espere en la clínica 15 minutos después de la inyección.
- Si tiene alguna reacción después del tratamiento (p. ej., salpullido, comezón, dificultad para respirar), infórmele de inmediato a un miembro del personal.
- Si estos síntomas ocurren después de abandonar la clínica, busque ayuda médica urgente de inmediato.

Instrucciones especiales (Special Instructions)

- No tenga relaciones sexuales:
 - Hasta una semana después de terminar su tratamiento de 1 día; **y**
 - Hasta una semana después de que su(s) pareja(s) sexual(es) haya(n) terminado sus tratamientos, aunque los resultados de su prueba sean negativos.
- Tendrá que volver a recibir tratamiento si tiene relaciones sexuales con una pareja que no ha recibido tratamiento, o si tiene relaciones sexuales antes de que el periodo de tratamiento suyo o de su pareja haya terminado. Consulte a su proveedor de atención médica.

Si tiene alguna pregunta o si necesita información adicional, visite www.smartsexresource.com o comuníquese con su proveedor de atención médica.