

# **CEFTRIAXONA (CEFTRIAXONE)**

La ceftriaxona es un antibiótico que se administra mediante una inyección intramuscular para el tratamiento de ciertas infecciones de transmisión sexual (ITS).

#### **Alergias (Allergies)**

Informe a su proveedor de atención médica si tiene alergia a alguno de los siguientes medicamentos:

- Otros antibióticos a base de cefalosporina (p. ej., cefuroxima, cefixima, cefotaxima, ceftazidima y cefepima).
- Lidocaína u otros anestésicos locales o fármacos del grupo de las amidas (p. ej., prilocaína). La ceftriaxona se mezcla con lidocaína para reducir el dolor en el sitio de la inyección.

## **Embarazo y lactancia (Pregnancy and Breast/Chest Feeding)**

La ceftriaxona puede usarse con cautela durante el embarazo y la lactancia. Consulte a su proveedor de atención médica.

## **ADVERTENCIA (CAUTION)**

- Informe a su proveedor de atención médica si tiene algún trastorno de la vesícula, del hígado, de los riñones, del páncreas, o algún trastorno de sangrado, o bien, si tiene antecedentes de disfunción estomacal, particularmente colitis.
- Si recibe una dosis de ceftriaxona, no se aplique las siguientes vacunas:
  - O Vacuna BCG intravesical consulte a su proveedor de atención médica
  - O Vacuna contra el cólera (Vaxchora®) en un plazo de 14 días a partir de la terapia con antibiótico
  - O Vacuna oral contra la fiebre tifoidea (Vivotif<sup>®</sup>) en un plazo de 3 días a partir de la terapia con antibiótico
- La ceftriaxona puede interferir con ciertas pruebas de glucosa en orina con reducción de cobre.
- La ceftriaxona está contraindicada en recién nacidos prematuros o en bebés de 28 días de edad o menos y en recién nacidos con altos niveles de bilirrubina en la sangre.

 Interacciones medicamentosas: tenga en cuenta que este documento ya no incluye las interacciones medicamentosas individuales. Hable con su proveedor de atención médica si toma algún producto recetado, de venta libre, a base de hierbas o recreativo.

## **Efectos secundarios (Side Effects)**

- Es posible que sufra de molestia, enrojecimiento o inflamación en el sitio de la inyección.
- Podría presentar diarrea.
- Si alguno de estos efectos persiste o empeora, comuníquese con su proveedor de atención médica.

## Atención después del tratamiento (Care Following Treatment)

- Espere en la clínica 15 minutos después de la inyección.
- Si tiene alguna reacción después del tratamiento (p. ej., salpullido, comezón, dificultad para respirar), infórmeselo de inmediato a un miembro del personal.
- Si estos síntomas ocurren después de abandonar la clínica, busque ayuda médica urgente de inmediato.

#### **Instrucciones especiales (Special Instructions)**

- No tenga relaciones sexuales:
  - Hasta una semana después de terminar su tratamiento de una dosis o hasta que haya completado su tratamiento de 7 días; Y
  - Hasta que su(s) pareja(s) sexual(es) también haya(n) recibido tratamiento, y que haya pasado una semana desde el inicio de su tratamiento, aunque los resultados de su prueba sean negativos.
- Tendrá que volver a recibir tratamiento si tiene relaciones sexuales con una pareja que no ha recibido tratamiento, o si tiene relaciones sexuales antes de que el periodo de tratamiento suyo o de su(s) pareja(s) haya terminado. Consulte a su proveedor de atención médica.

Si tiene alguna pregunta o si necesita información adicional, visite <u>www.smartsexresource.com</u> o comuníquese con su proveedor de atención médica.