



BC Centre for Disease Control
Provincial Health Services Authority

Clinical Prevention Services
Provincial STI/HIV Clinic

655, 12^e avenue ouest
Vancouver, C.-B. V5Z 4R4

Tél : 604-707-5600
Télééc. : 604-707-5604

www.bccdc.ca
www.SmartSexResource.com

Doxycycline Doxycycline

La doxycycline est un antibiotique administré par voie orale pour traiter certaines infections transmissibles sexuellement (ITS).

Allergies (Allergies)

- Informez votre fournisseur de soins de santé si vous êtes allergique à des **antibiotiques de tétracyclines** tels que la doxycycline, la minocycline ou la tétracycline.

Grossesse et allaitement (Pregnancy and Breastfeeding)

- La doxycycline n'est **pas** sans danger pendant la grossesse.
- La doxycycline doit être évitée pendant l'allaitement en raison de son absorption potentielle par les nourrissons. Consultez votre fournisseur de soins de santé.

MISES EN GARDE (CAUTION)

- **Interactions médicamenteuses** : Informez votre fournisseur de soins de santé si vous prenez des produits sur ordonnance, en vente libre, à base de plantes ou récréatifs. Toutes les interactions médicamenteuses individuelles ne sont pas répertoriées dans ce document.
- La doxycycline peut rendre votre peau plus sensible et vous pouvez attraper un coup de soleil. Évitez l'exposition au soleil ou aux rayons UV artificiels (lampes solaires ou lits de bronzage). **Utilisez un écran solaire (FPS 15 minimum)** et portez des vêtements de protection si vous êtes au soleil.
- **Ne prenez pas de suppléments de fer, de calcium, d'antiacides à base d'aluminium et de magnésium ni de sous-salicylates de bismuth** (Pepto Bismol^{MD}) en même temps que la doxycycline. Prenez la doxycycline 2 heures avant ou 6 heures après la prise de ces produits.
- **La doxycycline peut aggraver les symptômes de la myasthénie grave.** Si vous avez une myasthénie grave (trouble neuromusculaire), veuillez consulter votre fournisseur de soins de santé avant de prendre la doxycycline.
- **Les médicaments suivants ne doivent pas être pris en conjonction avec la doxycycline :**
 - **acitrétine** (Soriatane^{MD}), **isotrétinoïne** (Accutane Roche^{MD}, Clarus^{MD}, Epuris^{MD}); et **alitrétinoïne** (Toctino^{MD}).

Doxycycline (suite) Doxycycline (cont'd)

Effets secondaires (Side Effects)

- Vous pouvez avoir des diarrhées, des nausées, des douleurs abdominales, des vomissements, des maux de tête, des éruptions cutanées ou une photosensibilité (sensibilité accrue au soleil).

Instructions pour la prise (Instructions for Taking)

- Prenez des médicaments avec de la nourriture pour éviter les maux d'estomac.
- Ne pas écraser, mâcher ou ouvrir la capsule.
- Avalez le médicament en entier avec un grand verre d'eau, puis restez debout pendant au moins 30 minutes.
- Si vous oubliez une dose, prenez-la dès que vous vous en rendez compte. Toutefois, s'il est proche de votre prochaine dose, sautez la dose et reprenez le temps de prise habituel. Ne prenez pas une double dose.

Instructions de conservation (Storage Instructions)

- Conservez ce médicament à la température ambiante entre 15 et 30 °C.
- Protégez-le de la lumière, de la chaleur et de l'humidité.
- N'utilisez pas ce médicament au-delà de la date de péremption imprimée.
- Ne le laissez pas à la portée des enfants.

Instructions spéciales (Special Instructions)

- N'ayez pas de relations sexuelles :
 - avant d'avoir terminé votre traitement ou comme conseillé par votre fournisseur de soins de santé; **et**
 - tant que vos partenaires sexuels n'ont pas également été traités **et** qu'une semaine s'est écoulée depuis le début de leur traitement, même si les résultats de leurs tests sont négatifs.
- Vous devrez suivre un nouveau traitement si vous avez des relations sexuelles avec un partenaire qui n'a pas été traité ou si vous avez des rapports avant même que toutes les parties concernées aient terminées leurs traitements. Veuillez en parler avec votre fournisseur de soins de santé.

Si vous avez des questions ou avez besoin de plus d'informations, consultez www.smartsexresource.com ou contactez votre fournisseur de soins de santé.