BC Centre for Disease Control
Provincial Health Services Authority

STI/HIV Services
Clinical Prevention Services
655 West 12th Avenue
Vancouver, BC V5Z 4R4

604.707.5600
604.707.5604
bccdc.ca
SmartSexResource.com

多西环素 (DOXYCYCLINE)

多西环素是用于治疗某些性传播感染疾病的口服抗生素。

过敏 (Allergies)

- 如果您对任何**四环素类抗生素**过敏，如四环素或米诺环素，请告知医务人员。

怀孕/哺乳 (Pregnancy and Breast/Chest Feeding)

- 怀孕期间服用多西环素是**不**安全的。
- 由于对婴儿暴露的影响不明，哺乳期间时应避免使用多西环素。请咨询医务人员。

警告 (CAUTION)

- 多西环素可使皮肤对光线更敏感，导致暴露的部位晒伤和/或出现刺痛、麻木或异常感觉。避免过度暴露在阳光或人造紫外线（太阳灯或日光浴床）之下。如在阳光下外出，要使用防晒霜并穿着防护衣物。
- 避免与多西环素同时服用含钙、铝、镁（常见于补充剂和抗酸剂中）或碱式水杨酸铋（Pepto Bismol®）的产品。请在服用这些产品前 2 小时或服用后 6 小时服用多西环素。
- **多西环素可能会恶化重症肌无力症状。**如果您有重症肌无力（神经肌肉疾病），请在服用多西环素前咨询医护人员
- 如果您有酵母菌感染的历史，请告知医护人员。
- **药物相互作用：**请注意，本文件不再列出个别药物的相互作用。如果您正在使用任何处方药、非处方药、草药或消遣性药物产品，请与医务人员讨论。

副作用 (Side Effects)

- 您可能会出现腹泻、恶心、突发性严重腹痛、呕吐、头痛、皮疹、光敏（对阳光的敏感性增加）

服药说明 (Instructions for Taking)

- 饭后服药以免胃部不适。
- 不要粉碎、咀嚼或打开胶囊。
- 用一整杯水吞下整粒胶囊，然后站立/坐直至少 30 分钟。

Last review by BCCDC Pharmacy: May 2025

- 如果漏服一剂，请在记起来后尽快服用。但是，如果服用下一剂的时间快到了，则跳过漏服的剂量，继续遵照平时的服药时间。不要服双倍剂量。

贮存说明 (Storage Instructions)

- 贮存于 15-30°C 室温下。
- 避光、防高温、防潮。
- 药物超出印明的失效日期，切勿使用。
- 谨防儿童接触。

特殊说明 (Special Instructions)

- 在满足下列条件之前，不要进行性生活：
  - 您的治疗开始后已满一周，或根据医嘱；并且
  - 任何现有伴侣开始治疗也已满一周，即使他们的检测结果为阴性亦需治疗。
- 如果您与未经治疗的伴侣发生性关系，或是在您或伴侣的治疗完成之前发生性行为，则需重新治疗。请与医务人员讨论。

如果您有疑问或需要更多信息，请访问 www.smartsexresource.com 或联系医务人员。