



BC Centre for Disease Control
Provincial Health Services Authority

Clinical Prevention Services
Provincial STI/HIV Clinic

655 West 12th Avenue
Vancouver, BC V5Z 4R4

Tel 604.707.5600
Fax 604.707.5604

www.bccdc.ca
www.SmartSexResource.com

多西环素 Doxycycline

多西环素是用于治疗某些性传播感染疾病的口服抗生素。

过敏(Allergies)

- 如果您对任何四环素类抗生素过敏，如多西环素、米诺环素或四环素，请告知医务人员。

怀孕/哺乳 (Pregnancy and Chest/Breastfeeding)

- 怀孕期间服用多西环素是不安全的。
- 哺乳期间时应避免多西环素，以免被婴儿吸收。请咨询医务人员。

警告 (CAUTION)

- **药物相互作用：**如果您在服用任何处方药、非处方药、草药或消遣娱乐产品，请告知医务人员。本文件未一一列出各种药物的相互作用。
- 多西环素可使皮肤更敏感，因而您可能会晒伤。避免接触阳光或人造紫外线（太阳灯或晒黑床）。使用防晒霜（最低 SPF 15），穿防护服。
- 请勿在服用多西环素的同时服用补铁剂、补钙剂、含铝和镁的抗酸剂或碱式水杨酸铋(PeptoBismol®)。请在服用这些产品前 2 小时或服用后 6 小时服用多西环素。
- 多西环素可能会恶化重症肌无力症状。如果您有重症肌无力（神经肌肉疾病），请在服用多西环素前咨询医护人员。
- 多西环素不能与以下药物同服：
 - 阿维 A 酸(Soriatane®)、异维 A 酸(Accutane Roche®、Clarus®, Epuris®)和阿利维 A 酸(Toctino®)

副作用 (Side effects)

- 您可能会出现腹泻、恶心、腹痛、呕吐、头痛、皮疹、光敏（对阳光的敏感性增加）。

多西环素（续） Doxycycline (cont'd)

服药说明 (Instructions for Taking)

- 饭后服药以免胃部不适。
- 不要粉碎、咀嚼或打开胶囊。
- 用一整杯水吞下整粒胶囊，然后站立/坐直至少 30 分钟。
- 如果漏服一剂，请在记起来后尽快服用。但是，如果服用下一剂的时间快到了，则跳过漏服的剂量，继续遵照平时的服药时间。不要服双倍剂量。

贮存说明 (Storage Instructions)

- 贮存于 15-30°C 室温下。
- 避光、防高温、防潮。
- 药物超出印明的失效日期，切勿使用。
- 谨防儿童接触。

特殊说明 (Special Instructions)

- 在未满足下列条件之前，不要进行性生活：
 - 您已经完成治疗，或遵照医务人员的建议，**并且**
 - 您的性伴侣也已接受治疗，**而且**自治疗开始后已经过了一周，即使他们的检测结果为阴性亦需治疗。
- 如果您与未经治疗的伴侣发生性关系，或是在您或伴侣的治疗完成之前发生性行为，则需重新治疗。请与医务人员讨论。

如果您有疑问或需要更多信息，
请访问 www.smartsexresource.com 或联系医务人员。